

Hud- och könssjukdomar

Till dig som ska behandlas med biologiskt läkemedel

Vad är ett biologiskt läkemedel?

Biologiskt läkemedel är ett äggviteämne som har skräddarsyttts för att blockera aktiviteten hos en kemisk budbärare i kroppen som t.ex. tumörnekrosfaktor (TNF) eller specifikt interleukin (IL). Dessa budbärare finns i höga halter hos patienter som har inflammatoriska sjukdomar som till exempel psoriasis. Genom att blockera dessa ämnen minskar inflammationen och sjukdomssymtomen. Dessa läkemedel används bland annat vid psoriasis, psoriasisartrit, inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatoid artrit.

När sätts behandlingen in?

Vid måttlig till svår psoriasis där annan systemisk behandling (exempelvis Neotigason och Metotrexat) inte är tillräcklig eller genomförbar. Effekten kan märkas efter 4-8 veckors behandling. Fortsatt förbättring kan förväntas i ytterligare ca 3-6 månader.

Dosering

Behandlingen ges i form av spruta eller injektionspenna under huden (subkutant). Man tar injektionerna regelbundet med lite olika tidsintervall beroende på vilket läkemedel du sätts in på. Behandlingseffekten utvärderas efter 3-4 månader efter start. Inför besök ska även blodprover tas. Vissa biologiska läkemedel kan ibland kombineras med Metotrexat.

Utredning inför start av biologiskt läkemedel

Före insättning ska blodprover tas samt lungröntgen genomföras bland annat för att utesluta eventuella dolda infektionssjukdomar som skulle kunna aktiveras vid biologisk behandling. Vi ordinerar elektroniskt en röntgenremiss som du utnyttjar genom att uppsöka Skaraborgs Sjukhus drop-in röntgenenheten. För mer information angående drop-in mottagningen var god

se <https://www.vgregion.se/radiologiskas>. Det krävs att du har friska tänder och tandkött för att minimera eventuella risker för infektioner som utgår från munhålan. Vid tveksamhet kontakta din tandläkare.

Vid start

Första injektionen ges på Hudmottagningen där du får information samt lär dig hur du ska ta ditt läkemedel.

Möjliga biverkningar

De flesta har inga obehag av sin behandling. Den vanligaste biverkan är reaktioner på injektionsstället. Andra biverkningar kan vara ökad infektionskänslighet så som förkylningar, luftrörskatarr samt hudinfektioner. Har du några obehag eller får symtom du inte känner igen kontakta din mottagning.

Vid sjukdom

Vid svårare infektioner där du får feber eller har sjukdomskänsla bör du göra uppehåll med din behandling. Är du osäker kontakta din mottagning.

Vid operationer

Inför planerad operation kan uppehåll i biologisk behandling behöva göras. Det beror på (1) den specifika produkten man har fått, (2) typ av operation samt (3) vilka övriga sjukdomar och behandlingar man har. Detta får alltid avgöras av den opererande doktorn som gärna kan konsultera din läkare hos oss. Behandlingen kan återupptas när operationssåret är läkt.

Graviditet och amning

Se information gällande det läkemedel du fått.

Vaccinationer

Du kommer att diskutera eventuella vacciner som bör tas inför behandlingsstart med din läkare. Influensavaccination rekommenderas årligen. Levande vaccin skall inte tas under behandling med biologiska läkemedel. Kontakta gärna Hudmottagningen för rådgivning.

Vid sjukdomskontakter – tala alltid om att du behandlas med biologiskt läkemedel!

Utarbetat efter SU:s patientinformation.

