

Hud- och könssjukdomar

Till dig som ska behandlas med Neotigason

Läkemedelsform: Kapsel 10 mg och 25 mg

Vad är Neotigason?

Neotigason är ett läkemedel avsett framförallt för behandling av psoriasis, men även för vissa andra hudsjukdomar. Kemiskt sett liknar det naturligt A-vitamin.

A-vitamin är nödvändigt för en normal utveckling av hud och slemhinnor liksom ett normalt mörkerseende. Neotigason har normaliserande effekt på hudcellerna vid psoriasis trots att A-vitaminbrist inte föreligger.

När sätts behandlingen in?

Det används till de svårare och mer utbredda formerna som inte svarar på lokalbehandling och/eller ljusbehandling. Neotigason ges ensamt eller tillsammans med ljusbehandling.

Dosering

I början av behandlingen börjar man med en lägre dos som ökas under tiden beroende på behandlingseffekten. Förbättringen kommer efter hand men det kan dröja upp till 4 månader innan full effekt erhålls. Vid långtidsbehandling hålls dosen så låg som möjligt för att minimera eventuella biverkningar.

Följ noga given läkarordination då dagsdosen kan variera under behandlingens gång.

Kapslarna bör tas tillsammans med måltid och hela dagsdosen kan tas samtidigt.

Kontroller

Blodprover tas innan behandlingen påbörjas samt efter 4 veckor och 12 veckor, därefter var 6:e månad.

Blodprover omfattar blodceller, leverfunktion, njurfunktion, blodfetter och blodsocker. För kvinnor i fertil ålder även graviditetstest. Det är viktigt att du sköter dina provtagningar.

Återbesök

När man står på ett läkemedel bör man komma på regelbundna återbesök. Första återbesöket är efter 3–4 mån efter start därefter var 6:e–12:e månad.

Möjliga biverkningar

Eventuella biverkningar liknar de som kan ses vid höga doser A-vitamin. Biverkningarna är dosberoende och mildras när dosen sänks. Diskutera med din behandlande läkare innan du själv ändrar dosen.

Redan under den första veckan kommer du sannolikt att märka en uttorkande effekt på hud och slemhinnor. Läpparna kan bli torra (använd t.ex. cerat frekvent) och du kan även bli torr i ögon och näsa (näsblod kan förekomma).

Ibland förekommer en kraftigare avfjällning av huden, framför allt i händer och i fotsulor.

Kontakta då din läkare för att diskutera dossänkning.

Ibland kan du uppleva en ökad törst och känna dig lite kladdig i huden trots att den är torr.

Efter 2–4 månaders behandling kan lättare håravfall förekomma men håret återkommer efter avslutad behandling. I sällsynta fall kan du besväras av muskel- och ledvärk, orolig mage, diarré och försämrat mörkerseende.

Påverkan på blodproverna ger sällan några besvär eller obehag. Förhöjda blodfetter förekommer och i sällsynta fall kan man få en retning av levern.

Tänk på att:

Neotigason är fosterskadande och får INTE ges till gravida kvinnor eller till dem som planerar att skaffa barn. Graviditet får inte förekomma eller riskeras från och med fyra veckor innan behandlingsstart, under behandlingen och under 3 år efter avslutad behandling!

Man skall vara försiktig med alkoholkonsumtion under behandling med acitretin och under två månader efter avslutad behandling. Anledningen är att Neotigason i kombination med alkohol gör att Neotigason dröjer kvar längre i kroppen samt belastar levern.

Du får inte donera blod under behandling och inom en 3-årsperiod efter avslutad behandling.

Neotigason ska inte kombineras med Tetracykliner (ett antibiotikum) eller Metotrexat (inflammationsreglerande läkemedel mot bland annat psoriasis).

Undvik vitamintabletter innehållande A-vitamin (på grund av ökad risk för biverkningar).

Om du använder epilepsimediciner måste du meddela din läkare detta eftersom doseringen kan komma att påverkas.

Om du har kontaktlinser bör du om möjligt använda glasögon eftersom ögonen kan upplevas som torra och irriterade under pågående behandling.

Du kan drabbas av försämrat mörkerseende (gäller främst yrkeschaufförer).

En ökad ljuskänslighet kan förekomma och du bör därför iaktta försiktighet vid solning.

Vid sjukvårdskontakter – tala alltid om att du behandlas med Neotigason!