

Har du frågor?

Angående sövningen

Telefon: 0500-47 36 80 mellan 10.30–11.00

För tidsbokning, ombokning och avbokning av operationstider

Kontakta sekreterare telefon: 0500-43 16 14

Öron-, näs- och halsavdelningen 82

Måndag-torsdag kl. 08.00-15.30

Fredag kl. 08.00-12.00

Rådgivning sjuksköterska

Öron-, näs- och halsmottagningen (ÖNH)

(Gemensamt för alla ÖNH - mottagningar)

Telefon: 0500-44 70 10

Måndag-torsdag kl. 08.00-10.30 och 13.00 – 14.30

Fredag kl. 08.00-10.30

Sjukvårdsrådgivningen

(kvällar, nätter och helger)

Telefon: 11 77

Vad händer när man kommer som barn till sjukhuset för att opereras?

Se barn information på webbadress.

<http://www.vgregion.se/skas-barn-dagkirurgi>

Information inför operation av utstående öron Skaraborgs Sjukhus Falköping

Öron-, näs- och halskliniken SkaS



Bakgrund

Det vanligaste skälet är att man av andra barn får kommentarer om sina öron vilket skapar besvär som gör att man väljer operation. Andra besvär kan till exempel vara svårigheter att ligga på öronen eller att bära cykelhjälm.

Före operationen

Man bör helst inte ha en pågående infektion vid operation. Ring till öronmottagningen vid till exempel förkylning, feber eller andra nyttillkomna symtom. Telefonnummer finns på sista sidan.

Att göra inför operation

Fasta 6 timmar före operation

Barnet/du ska vara fastande inför operation, vilket innebär att barnet/du inte får äta någon fast föda eller dricka mjölkprodukter sex timmar innan operationen. Detta är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Tuggummi, snus och rökning ska också undvikas. Drick gärna vatten, saft eller kaffe/te utan mjölk, fram till två timmar innan operationen.

Innan operationen behöver håret rakas bort från ett smalt område närmast örat. Detta sker vid förberedelserna på operation.

Barn information:


Innan ni åker till sjukhuset sätter ni på fyra Emla-plåster

(bedövning av hud inför nålsättningen). Sätt Emla-plåstren i båda armvecken och på båda handryggar. (se bild).

Emla-plåster inhandlas receptfritt på apoteket.

Hur går operationen till?

Under operationen är man vanligen sövd men en del opereras i lokalbedövning. Detta bestäms vid det första besöket. Man gör ett snitt via örats baksida och frilägger huden från brosket, som sedan kan slipas tunnare så det utan spänning kan lägga sig mer bakåt. Ofta är även öronmusslan djup och man tar då bort en strimma av brosk där. Efter att man sytt ihop såret, läggs ett förband bestående av tejp, bomull och kompresser runt öronen samt en linda som fixeras med tejp runt huvudet.



När man är helt vaken och mår bra kan man åka hem igen. Det är viktigt att förbandet får sitta kvar till återbesöket efter ungefär en vecka. Man får under denna tid inte blöta ner förbandet och kan alltså inte tvätta håret. Tiden för återbesöket brukar man få innan man åker hem.

Efterförlopp

Det är vanligt med en del smärta första dygnet när bedövningen släppt. Smärtan behandlas efter behov med Alvedon. Om man får mer intensiva smärtor på en eller båda sidor, vid blödning ur förbandet, vid feber eller andra infektionstecken eller om förbandet glider fel skall man kontakta öronkliniken. De flesta brukar vara hemma från skolan och ta det lite lugnare under denna tid. I övrigt kan man vara ungefär som vanligt.

Vad händer vid återbesöket?

Hela förbandet tas bort men stygnen lämnas kvar. De faller bort av sig själv så småningom. En del upplever kortvarigt obehag när man tar bort sårtejp ungefär som när man tar bort plåster. Öronen kommer att vara lite svullna, rodnade och eventuellt missfärgade och kan kännas lite annorlunda, men normal färg och känsel återvänder med tiden. När man kommit hem får man duscha och tvätta håret igen.

Kontroller

Avslutande besök sker efter ungefär 3 månader då man ser resultatet och tar ett fotografi. Tid för återbesök får ni beställa själv.

Vad finns det för risker?

Komplikationer kan förekomma i form av blödning och infektion. Om man behandlar dessa på rätt sätt är riskerna för kosmetiskt sämre resultat mycket små. Vid misstänkt komplikation skall man bedömas av öronläkare som väljer lämpligaste behandling. I enstaka fall måste man operera igen för att komma till rätta med en blodutgjutning.