

Kortfattad lathund för val av kompression

Compri 2

Används vid bra cirkulation, ankel/arm index ska vara >0.8 , ger ett kompressionstryck på 40 mmHg vid ankeln. Palpabel puls på fotryggen ger indikation på bra arteriell cirkulation. Lindas om 1–2 ggr. per vecka

Compri 2 lite

Används vid misstanke på sämre arteriell cirkulation, ankel/arm index 0.5–0.8, ger ett kompressionstryck på 20–30 mmHg vid ankeln. Bra till patienter med diabetes och hjärt-/kärlsjukdom där misstanke kan finnas på stela kärl. Lindas om 1–2 gånger per vecka

Comprilan dubbelbandagering

Används vid bra arteriell cirkulation men även vid sänkt. Ger ett kompressionstryck på 30–40mmHg vid ankeln. Måste lindas om minst 2 ggr. Per vecka, för att behålla trycket, kan lindas om oftare vid behov.

Elodur forte

Används vid bra arteriell cirkulation är en höglastisk binda som ska tas av till natten, lindas på, på morgonen. Det förutsätter att patienten eller närstående kan göra detta själva. Palpabel puls på fotryggen ger indikation på bra arteriell cirkulation. Lätt att linda själv då denna binda lindas med cirkelturer.

Co-Plus latexfri

Används både vid bra arteriell cirkulation och vid sänkt. Självhäftande binda som lindas med cirkelturer med 75–80% överlappning, vid sänkt cirkulation lindar man med glesare överlappning, 50%. Ger ett kompressionstryck på 20–30 mmHg. Lindas om minst 2 ggr. per vecka eller oftare vb.

Behandlingsstrumpa Jobst UlcerCare

Används vid bra arteriell cirkulation, ankel/armindex från 0.8, ger ett kompressionstryck på 40 mmHg vid ankeln. Finns i lager i förrådet vid bensårsmottagningen. Ankel och vadmått mäts för att få rätt storlek. Innerstrumpan ger ett tryck på 10 mmHg och kan sitta på dygnet runt, ytterstrumpan ska tas av till natten och ger ett tryck på 30 mmHg. Palpbel puls på fotryggen ger indikation på bra cirkulation.

Kompressionsstrumpa klass 1/"stödstrumpa"

Smidigt att använda för patienten vid mildare ödem och kan skötas självständigt. Ger ett kompressionstryck på 15-21 mmHg

Blå tubifast

Bra vid mildare ödem eller där patienten har lägre arteriell cirkulation, vid 2 lager med blå tubifast ger det ett kompressionstryck på runt 15-21 mmHg. Patienten kan sköta detta självständigt.