

## Information till dig som har fått recept på smärtstillande läkemedel

### معلومات إلى من حصل على وصفة طبية لتناول مسكّنات

□ أقراص باراسيتامول (ألفيدون، بانوديل، بامول، ريليف)  
هذه أدوية مسكنة للألم يمكن شراؤها عادةً من الصيدلية بدون وصفة طبية. والتأثيرات الجانبية لهذه الأدوية قليلة أو غير موجودة عند تناول الجرعة الموصى بها.  
الجرعة القصوى: 4 غ باليوم  
الجرعة: 1 غ (قرصان) كل 6 ساعات.

□ أقراص ديكلوفيناك  
دواء مسكن ذو مفعول جيد، ويُحبذ تناوله سوية مع الباراسيتامول. قد يسبب التهاباً في الغشاء المخاطي للمعدة أحياناً ويزيد من إمكانية حدوث النزيف. ينبغي عدم تناوله عند وجود قصور في القلب أو قصور في الكلية أو ربو أو أثناء الحمل أو عند وجود حساسية مفرطة من الماغنيسيوم.  
الجرعة القصوى: 150 ملغ باليوم (50 ملغ كل 8 ساعات).

□ كبسولات أوكسينورم (أوكسيدوكون) **Δ**  
تستخدم لمعالجة الألم الحادة. وعادة ما  
الأعراض الجانبية لهذا الدواء: الشعور بالغثيان والتعب. و  
تأثيره لمدة 6  
الجرعة: كبسولة واحدة كل 6 ساعات.

**تحذير من القيادة أثناء تناول العقار **Δ****  
قد يُضعف أوكسينورم القدرة على ردّ الفعل. ويلبّي عليك التفكير في ذلك عندما تقوم بالموار تظفب الأنتباه الشديد، مثل قيادة السيارة، أو عندما تقوم بعمل دقيق أو عندما تستخدم الآليتم بلوغ أقصى تأثير للمسكن في غضون ساعة واحدة من تناوله. ويستمر ساعات تقريباً. يجب عدم تناول أوكسينورم أثناء الحمل والرضاعة.  
بما أنه أجريت لك عملية فمن المرجح أن تشعر بألم ما بعد العملية الأولى. اتبّع التعليمات للحصول على أفضل فعالية. وإن لم تشعر بأي ألم، فلا حاجة طبعا

### معلومات عامة

- لا تدمج بين المسكّنات بدون الاتصال بنا
  - تدكّر أن تتناول الأقراص مع السوائل.
  - إياك أن تجمع ما بين أوكسينورم والمشروبات الكحولية.
  - يجب تسليم الأدوية غير المستعملة إلى أقرب صيدلية.
- وسوف تحصل على وصفة طبية بالأدوية التي يمكن أن تتناولها في الأيام لتناول الأقراص.

### العيادة النسائية

مستشفى سكارابوري في شوفده