

Lathund postoperativa rutiner

Vid mer information, osäkerhet eller frågor läs styrdokument för varje operation.

	Hysterektomi via laparotomi	Prolapsoperation	LAVH – laparaskopiassisterad vaginal hysterektomi	Laparoskopi, t e x extrauterin grav, cysta o s v	Exeres (VEX)/abrasio
Vid ankomst till avd	<ul style="list-style-type: none"> Förband. Kontrollera vaginal blödning. Skriv upp UM från postop. Ge dryck. BT och puls vid behov. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vaginal blödning. Skriv upp UM från postop. Ge dryck. BT och puls vid behov. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vaginal blödning. Förband. Skriv upp UM från postop. Ge dryck. BT och puls vid behov. 	<ul style="list-style-type: none"> Förband. Kontrollera vaginal blödning. BT och puls vid behov. Ge dryck. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vaginal blödning. BT och puls vid behov. Ge dryck.
Urinmätning	Ja, mätning t o m postopdag 1.	Ja, mätning t o m postopdag 1.	Ja, mätning t o m postopdag 1.	Vid KAD = urinmätning, annars ej.	Ej enligt rutin.
Bladderscan (dokumenteras i blåsscanningsmall)	Följ styrdokument "Postoperativ kontroll av urinblåsa". OBS! KAD-avveckling startas. Bladderkontroll efter 4 tim om pat inte kissat.	Följ styrdokument "Postoperativ kontroll av urinblåsa". OBS! KAD-avveckling startas. Bladderkontroll efter 4 tim om pat inte kissat.	Följ styrdokument "Postoperativ kontroll av urinblåsa". OBS! KAD-avveckling startas. Bladderkontroll efter 4 tim om pat inte kissat.	Följ styrdokument "Postoperativ kontroll av urinblåsa". OBS! KAD-avveckling startas. Bladderkontroll efter 4 tim om pat inte kissat.	Följs styrdokument "Postoperativ kontroll av urinblåsa". OBS! KAD-avveckling startas. Bladderkontroll efter 4 tim om pat inte kissat.

Tarmar och mobilisering	<ul style="list-style-type: none"> • Viktigt med tidig mobilisering, följ med pat. • Pip – vid tarmkramp. • Cilaxoraldrp vid gasavgång. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viktigt med tidig mobilisering, följ med pat. • Pip – vid tarmkramp. • Cilaxoraldrp vid gasavgång. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viktigt med tidig mobilisering, följ med pat. • Pip – vid tarmkramp. • Cilaxoraldrp vid gasavgång. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viktigt med tidig mobilisering, följ med pat. • Uppspändhets-känsla efter gas i buken under op, stiger uppåt mot bröstorg/axlar. • Vetekudde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisering, följ med pat.
Övriga observationer	CRP dag 1, 3 och 5 Fragminträna tidigt.	Ev Fragminträna tidigt. Tamponad dras i samband med KAD-dragning postopdag 1 om inget annat anges.			

EDA-rutiner:

- **EDA-kontroller enligt rutinblad.**
- **EDA som skall stängas av: Oxycontin ges av natten kl 6.00. EDA:n stängs sedan av vid kl 8.00 med slangen kvar i ryggen. Efter lunch kan EDA-slangen dras efter godkännande av läkare.**
- **KAD kan sedan avvecklas efter 2 tim.**