

Västra Götalandsregionen

Skaraborgs Sjukhus

Kvinnokliniken, gynnottagningen

Utskrivningsbesked – hysteroskopi i lokalbedövning

Efter operationen

Beskrivning av ingreppet

Vi har undersökt din livmoderhåla med hjälp av ett hysteroskop. Synliga förändringar, till exempel polyper eller mindre muskelknutor, har tagits bort med en liten hyvel.

Läkemedel

Om du har läkemedel sedan tidigare ska du fortsätta att ta dessa på samma sätt.

Efter ingreppet

De första veckorna kommer det oftast lite blodflytning via slidan, använd inte tampong. Under denna tid ska du inte bada, duscha går däremot bra. Undvik samlag under tiden du blöder.


Det är okej att träna, men vi rekommenderar att du tar det lugnt första dygnet efter ingreppet.

Trötthet och lätt till måttlig smärta i underlivet är normalt den första tiden. Ta de smärtstillande tabletter som rekommenderats, Alvedon/Pamol 500 mg 2 tabletter 4 gånger per dag och Ibumetin/Ipren 400 mg 1 tablett 3 gånger per dag vid behov upp till tre dagar. Meddela oss operationsdagen om du inte tål något av dessa preparat.

Om du får feber, illaluktande flytning eller rikligare blödning – kontakta kvinnoklinikens mottagning: dagtid gynnottagningen, telefon 010-473 92 20, telefontid måndag–torsdag 07.00–14.30, fredagar 07.00–11.30. kvällar och helger, 1177.

Uppföljning

- Om det i samband med ingreppet tagits något prov kommer du att få brev- eller telefonbesked om cirka fyra veckor. Om du inte får något besked – kontakta själv mottagningen.

Var god vänd 

- Om du innan operationen fyllt i en enkät kommer du att få en ny enkät efter cirka åtta veckor och ett år. Utifrån enkäterna bedömer vi behov av återbesök.

Med vänlig hälsning
Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus