

## Lathund för insättning av Trombyl

Profylax ges till samtliga som har en av följande riskfaktorer:

- SLE eller APLS (antifosfolipidsyndrom).
- Tidigare preeklampsi eller eklampsi.
- Tidigare graviditetshypertoni med något av följande:
  - Debut eller förlossning före graviditetsvecka 34.
  - IUGR.
  - IUFD.
  - Ablatio.
- Pregestationell diabetes (typ 1- eller typ 2-diabetes).
- Flerbörd.
- Kronisk njursjukdom med funktionsnedsättning.
- Kronisk hypertoni.
- Äggdonation.

Profylax övervägs vid minst tre av följande måttliga riskfaktorer:

- Nullipara.
- Förstegradshereditet för preeklampsi.
- BMI > 30.
- Ålder > 40 år.
- Graviditetsintervall > 10 år.
- Systoliskt blodtryck > 130 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck > 80 mmHg vid inskrivning.
- Afrikansk etnicitet.
- Verifierad obstruktiv sömnapné.
- "White coat hypertension" (upprepad hypertoni vid blodtryck tagna på sjukhus men normala blodtryck registrerade i hemmet).
- Tidigare graviditetshypertoni med debut efter 34 graviditetsveckor.
- Annat: \_\_\_\_\_