

Patientinformation – graviditet med oklar lokalisation

Många kvinnor söker vård på grund av blödning och/eller blödning i tidig graviditet. Hos en del av dessa kvinnor kan ingen graviditet ses med ultraljud vid första undersökningen, vilket benämns ”graviditet med oklar lokalisation”.

Det kan innebära att kvinnan drabbats av missfall, men det kan också vara en normal graviditet som är för liten för att vi ska kunna se den vid ultraljudsundersökningen. Ett mer ovanligt tillstånd är utomkvedshavandeskap eller extrauterin graviditet, där graviditeten fäster i en äggledare. Utomkvedshavandeskap behöver ofta behandlas, antingen med medicin eller en titthålsoperation.

Rutinmässigt ordinerar läkaren ett blodprov för mätning av ett graviditetshormon (hCG) vid två tillfällen. Beroende på hur mycket hCG-värdet ökar eller minskar mellan provtagningarna kan läkaren bedöma om det troligen rör sig om en normal graviditet, ett missfall eller ett utomkvedshavandeskap. Ibland behövs ytterligare blodprovstagningar och ultraljudsundersökningar innan det säkert går att avgöra var graviditeten är belägen.

Du kommer att lämna två blodprover med cirka 48 timmars mellanrum för analys av hCG. Informationen om den fortsatta handläggningen får du av barnmorska eller läkare som kontaktar dig per telefon, oftast vardagen efter det andra blodprovet.

Ett av följande tre handläggningsalternativ är möjligt

- Blodproverna talar för missfall. Du tar ett graviditetstest hemma efter två veckor och hör av dig till gynmottagningen om det fortfarande är positivt. Du bör också höra av dig om du fortfarande blöder färskt efter två veckor.
- Blodproverna talar för en normal, tidig graviditet. Du genomgår en förnyad läkarundersökning med ultraljud efter en vecka. Det är ingen idé att göra undersökningen tidigare än så eftersom graviditeten tillväxer mycket långsamt.
- Blodproverna kan inte utesluta utomkvedshavandeskap. Du genomgår en förnyad läkarundersökning med ultraljudsundersökning inom 48 timmar.

Om du under uppföljningstiden får tilltagande besvär exempelvis magont är det viktigt att du kontaktar sjukvården, oavsett vad blodproverna visat. Likaså om du får feber eller blöder rikligt och ihållande. Om du inte har blivit kontaktad inom två dagar efter det sista blodprovet vill vi också att du ringer till oss.

Medan du blöder, undvik samlag, tampong och bad för att minska infektionsrisken. Duscha och använd binda i stället. När blödningsen upphör kan du leva som vanligt igen.

Telefonnummer till gynnottagningen: 010-473 92 20

Kvinnokliniken
Skaraborgs Sjukhus