

Patientinformation Fragmin vid graviditet – högrisk

Bakgrund

Venös tromboembolism innebär tromber i benens eller armarnas vener, sinustrombos samt lungemboli.

Graviditet ökar risken för venös tromboembolism med cirka tio gånger. Trombosrisken i samband med en graviditet bedöms i Sverige med hjälp av en riktad riskpoäng. Poängsumman ligger till grund för bedömningen av när och hur tromboprofylax ska ges. När tromboprofylax är indicerad under och efter en graviditet används Fragmin som tas som dagliga injektioner.

Högrisk

Du har nu träffat en läkare och vi har tagit blodprover för att se dina utgångsvärden.

Recept på blodförtunnande Fragmin, förfyllda sprutor, finns klart att hämta ut på apoteket. OBS! Ibland är det två olika doser på sprutorna. För information om sprutteknik hänvisar vi till den informationsfilm som finns på hemsidan medicininstruktioner.se. I sökrutan skriver du Fragmin och klickar dig vidare till filmen. Vi rekommenderar även att du använder stödstrumpor.

I ditt fall ska du ta sprutan i magen. Eftersom du ska ta din spruta både morgon och kväll ska du tänka på att ta den samma tid både morgon och kväll, till exempel kl 9.00 och 21.00. Efter en vecka går du till din vårdcentral för provtagning. Blodprovet tas. Efter blodprovet tar du din Fragminspruta och tre timmar efter att du har tagit sprutan ska du ta ett blodprov igen. Det blir då ett "före- samt efterprov". Remiss för provtagning har du fått på specialistmödravården. När vi har fått svaret på dina prover kontaktar vi dig på telefon och justerar eventuellt din dos. Vi informerar dig då även om när nästa provtagning ska ske.

Graviditetsvecka 34

Du får en tid för telefonsamtal/digitalt vårdmöte med läkare.

En vecka innan telefonsamtalet med läkaren går du till din vårdcentral för provtagning.

Vid samtalet med läkaren görs planering inför kommande förlossning.

Vid förlossningsstart

Ring till förlossningen och berätta att du står på Fragmin. Fragmindosen justeras under förlossningen. När du kommer till förlossningen kommer dina värden att kontrolleras med blodprov.

Efter förlossningen kommer du få fortsätta med Fragmin. Du får information på BB vad som gäller för dig.

Vid en eventuell ny graviditet ska du informera din barnmorska på mödravården om att du vid tidigare graviditet har tagit Fragmin och varför.