

Datum: _____

Avs: _____

Remiss till vårdcentralen _____

Tacksam om ni kan utföra tredagars glukosprofil på denna patient, gravid i vecka _____

BPU _____ då hon inte kan genomgå OGTT på grund av:

- tidigare GBP-opererad
- svår hyperemesis
- annan indikation _____

Resultat - p-glukos

	Morgonmål		Lunch		Kvällsmat		Natt
	före	2 tim efter	före	2 tim efter	före	2 tim efter	innan läggdags
Dag 1							
Dag 2							
Dag 3							

Tacksam om patienten kallas snarast, **senast inom 1 vecka**. Remissvar = journalanteckning till vederbörande BMM.

Patienten instrueras för egenmätningar av sjuksköterska på vårdcentral och bokför resultatet i tabellen, patienten lämnar sedan ifylld blankett till BMM.

Tolkning av svar - fylls i av barnmorska på BMM - bokförs sedan i MHV3

- * Ett värde faste-p-glukos $\geq 7,0$ eller minst tre värden $\geq 8,0$ efter måltid = diagnos GDM
- * Om faste-p-glukos $\geq 12,2$ behöver inte tredagarsprofil fullföljas, räcker då för diagnos GDM
- Normal tredagars glukosprofil

Patienten lämnar tillbaka utlånad utrustning till vårdcentralen.

* Patienten handläggs efter styrdokumentet

[Graviditetsdiabetes](#)