

## Läkemedel vid blödning

Läkemedel som är **blåmarkerat** förvaras i kylan i läkemedelsrummet

Oxytocin 8,3 µg/ml	1 ml i v
<b>Methergin 0,2 mg/ml</b>	1 ml ges i m <b>Kontraindikation: Högt blodtryck, preeklampsi</b>
Tranexamsyra 100 mg/ml = Statraxen	1 ampull (10 ml) ges långsamt i v under 10 minuter alternativt blandas med 100 ml NaCl och ges som infusion under 10 minuter
Oxytocin 8,3 µg/ml	6 st ampuller à 1 ml blandas i 500 ml NaCl (dropptakt – 120 ml/timme)
<b>Prostinfenem 0,25 mg/ml</b>	<b>Förvaras i beredningsrum på förlossningen</b> 1 ml ges i m, kan upprepas 8 gånger med 15 minuters intervall Kan också ges som lokal injektion i myometriet, späds: 1 ml blandas med 9 ml NaCl <b>Kontraindikation: Astma</b>
Cytotec 0,2 mg	3 st rektalt alternativt 1 tablett sublingualt
Efedrin 5 mg/ml	Ordineras av narkospersonal
Adrenalin 0,1 mg/ml	Ordineras av narkospersonal
Riastap (fibrinogen)	<b>Förvaras i beredningsrum på förlossningen</b> 1 flaska blandas med 50 ml <b>sterilt vatten</b> 4 st flaskor ges per tillfälle Ordineras av narkospersonal