

Information till dig som har fått recept på smärtstillande läkemedel

Tabl Paracetamol (Alvedon, Panodil, Pamol, Reliv)

Detta är en smärtstillande medicin som normalt kan köpas på apotek utan recept. Den har få eller inga bieffekter vid rekommenderad dosering.

Maxdos: 4 g/dygn.

Dosering: 1 g (2 tabletter) var 6:e timme.

Tabl Ibuprofen (Ipren, Ibumetin, Ibumax)

Är ett smärtstillande läkemedel med god effekt och tas med fördel i kombination med paracetamol. Kan ibland ge magkatarrbesvär och ökad blödningsbenägenhet. Bör inte intas vid hjärtsvikt, njursvikt, astma, graviditet eller magnecylöverkänslighet.

Maxdos: 1200 mg/dygn.

Tabl OxyNorm (oxykodon)

Används för att behandla svår smärta. OxyNorm ska användas som tillägg, om de vanliga smärtstillande läkemedel du har fått inte räcker till. Kapseln bör sväljas hel. En biverkning kan vara illamående, förstoppning och trötthet. Maximal smärtstillande effekt uppnås inom en timme och varar cirka 6 timmar. OxyNorm ska undvikas vid graviditet och amning.

Dosering: 1 kapsel var 6:e timme.

Trafikvarning

OxyNorm kan försämra reaktionsförmågan. Detta bör du tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning, om du utför precisionsarbete eller använder maskiner.

Som nyopererad patient kommer du troligen att känna mer eller mindre smärta efter operationer. Du får med dig recept på mediciner som du kan ta under de första dagarna. För bästa effekt följ ordinationen nedan. Om du inte upplever smärta behöver du förstås inte ta tablettarna.

Allmän information

- Kombinera inte med andra smärtstillande medel utan att kontakta oss.
- Kom ihåg att ta alla tabletter med vätska. Det underlättar nedsväljandet.
- Tänk på att inte kombinera OxyNorm med alkohol.
- Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek.