Information till patient som skall genomgå röntgenundersökning med kontrastmedel (jod eller gadolinium) och som tidigare har haft en **sen överkänslighetsreaktion** på kontrastmedlet.

Patient:_____ Pers nr:_____

Vi har fått information om att du fått en sen överkänslighetsreaktion vid tidigare undersökning med kontrastmedel. Eftersom denna reaktion har upplevts som påtagligt besvärande för dig skall du nu premedicinera med Tablett Prednisolon (kortison) i samband med din kommande undersökning, för att minska risken att sen överkänslighetsreaktion uppkommer.

Tillsammans med denna information får du en påse innehållande läkemedlet
Tablett Prednisolon 10 mg (totalt 20 stycken) som du skall ta enligt nedan:

- Prednisolon® tabletter 10 mg – dagen före undersökning tas 5 tabl. (totalt 50 mg) före sänggående på kvällen.
  Därefter 2 ½ tabl. (totalt 25 mg) per dag i 3 dagar.
  Om överkänslighetsreaktion uppträder trots detta, ökar du dosen till 5 tabl. (totalt 50 mg) per dag.

Obs! Vid uttalade besvär trots premedicinering, eller vätskefyllda blåsor bör sjukvård uppsökas för bedömning och eventuell ytterligare behandling.

Allmän information kring sena överkänslighetsreaktioner:

- De är ovanliga och i de allra flesta fall lindriga och övergående.
- I de allra flesta fall är reaktionen inte kraftigare än vid den tidigare reaktionen.
- När de förekommer så uppträder de mellan 1 timme och 1 vecka efter kontrastmedelsinjektion.
- Vid förnyad tillförsel av kontrastmedel förekommer ånyo en senreaktion hos endast ca 10-30 % av de som tidigare fått en senreaktion.

Om du har frågor, kontakta den Radiologiska avdelning där du skall undersökas, telefonnummer finns på kallelsen.
Om du trots premedicinering fått ny sen överkänslighetsreaktion vänligen meddela detta till oss på radiologin, tidsbokning telefon 0500-44 70 20.

Datum / - 20

Med vänlig hälsning

_____ _____
Sign ordinerande läkare Sign utlämnande rtg-ssk/ssk/BMA

_____ _____
Namnförtydligande Namnförtydligande

Information om läkemedlet finns på baksidan.

Tablett Prednisolon 10 mg

Vad innehåller läkemedlet?
1 tablett innehåller
Aktiva substansen är: prednisolon 10 mg
Hjälpämnen: laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, talk och potatisstärkelse.

Hur påverkar läkemedlet?
Prednisolon är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär

Förvaring och hållbarhet
Förvaras i rumstemperatur och utom syn- och räckhåll för barn.
Användes före det utgångsdatum som står på påsen
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek.