

Bilägges enhetens läkemedelsinstruktion, bevaras

Dokumentnamn	Gäller vid (ange kortnamn i Mellor)	Gäller vid	
Generell ordination injektion av adrenalin vid anafylaxi		SkaS VO9 BFM SkaS	Sida 1 av 1
Ersätter tidigare daterad	Utarbetad av:	Godkänd / Fastställd av:	Gäller fr o m
2023-09-01	Annica Berg	Karin Wennerstrand 	2024-09-01
	Namnförtydligande och titel:	Namnförtydligande Läkemedelsansvarig läkare BFM	
	Övergripande läkemedelsansvarig ssk BFM		

## Generell ordination för injektion av adrenalin Emerade, EpiPen eller Jext vid anafylaxi.

*Gäller endast om läkare ej finns på plats.*

**Att utföras av röntgensjuksköterska/sjuksköterska/BMA**

**Definition av anafylaxi:** Anafylaxi är en akut allvarlig systemisk överkänslighetsreaktion från flera organ och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan. Dessutom föreligger vanligen symtom från hud, slemhinnor eller mag-tarmkanalen. Observera att symtom enbart från hud och slemhinnor inte är anafylaxi, men kan vara förebud.

Organsystem	Symtom/tecken
Respiratoriska	Hosta, heshet, stridor (inspiratoriska eller expiratoriska), cyanos
Kardiovaskulära	Blodtrycksfall, takykardi/bradykardi, inkontinens, medvetandesänkning
Gastrointestinala	Ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré
Hud och slemhinnor	Klåda, hudrodnad, urtikaria, angio-/Quinckeödem (svullnad av läppar, tunga och uvula)
Ögon och näsa	Konjunktivit med klåda rodnad; nästäppa med klåda, nysningar, rinnande snuva
Gastrointestinala	Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning

### ***Anafylaxi utan medvetandepåverkan:***

Intramuskulär injektion av adrenalin med adrenalinpenna

**Vuxna, barn och ungdomar över 30 kg ges Emerade, EpiPen eller Jext 300 mikrogram.**

**Patienter mellan 15 kg och 30 kg ges Emerade, EpiPen eller Jext 150 mikrogram.**

En initialdos ska ges så snart som symtom på anafylaxi observeras.


**Emerade ska ges intramuskulärt på lårets utsida.**

I avsaknad av klinisk förbättring eller om försämring inträffar, kan en andra injektion med ytterligare en Emerade, EpiPen eller Jext dos ges 5-15 minuter efter den första injektionen om läkare ännu inte anlant.

**INGA KONTRAINDIKATIONER RÅDER FÖR BEHANDLING AV**

**ANAFYLAXI MED I.M. ADRENALIN ENLIGT OVAN**

Denna ordination gäller till 2025-08-31

 ..... Karin Wennerstrand Läkemedelsansvarig läkare