

Blödningsscintigrafi

Bakgrund

Blödningsscintigrafi görs för att påvisa och lokalisera pågående tarmlödning. En lokal ansamling av aktivitet i buken som förflyttas med tarmperistaltiken talar för blödning. Ju större blödning desto lättare kan den påvisas.

Indikationer

- Misstänkt blödningsskälla i intestinalkanalen.
- Sjunkande Hb utan känd orsak.
- Komplement vid misstänkt tarmlödning där endoskopi inte är möjlig.

Upplysningar på remiss

- Kort anamnes, klinik och riktad frågeställning.
- Aktuellt Hb
- Resultat av eventuell endoskopi.

Förberedelser

- Patienten ska vara cirkulatoriskt stabil.
- Fungerande PVK (valfri färg och placering). CVK eller PAC är ej önskvärt.
- Det är bra om patienten kan dricka kaffe och äta före och mellan bildtagningarna då detta kan trigga igång blödningen.
- Patienten uppmanas tömma blåsan ofta.

Utförande

Vi injicerar ett radioaktivt läkemedel och bildtagning sker vid flera tillfällen. Varje bildtagning tar cirka 40 minuter och sker med hjälp av gammakamera. Kameran kommer vara nära patienten. Personalen lämnar tid för nästkommande bildtagning. Eventuellt sker även en bildtagning dagen efter.

Kontaktrestriktion

Patienten ska undvika kontakt med småbarn och gravida 5 timmar efter injektion. Gravid personal bör ej heller ta hand om patientens urin under denna tid.