

Xofigo-behandling

Bakgrund

Vid skelettmetastasering kan patienten få smärtor samt ett försvagat skelett vilket kan leda till frakturer eller svårigheter att röra sig. Om spridningen endast är till skelettet kan Xofigo ge smärtlindring. Xofigo innehåller Radium223 som i huvudsak är alfastrålande. Alfastrålning har en mycket kort räckvidd, vilket innebär att den effektivt kan döda cancerceller med minimal skada på intilliggande frisk vävnad. Behandlingen inkluderar även en liten mängd gamma- och betastrålning, men dessa har mindre effekt på patientens behandling och biverkningar.

Det är viktigt att notera att Xofigobehandling inte botar cancer. Syftet med Xofigo är smärtlindring. Smärtlindring sker inom två till tre veckor från injektionen. En ökning av smärta kan upplevas den första veckan (flare) efter injektionen. Alla blir dock inte helt smärtfria.

Indikationer

- Behandling av vuxna med kastrationsresistent prostatacancer - prostatacancerpatienter med minst två symptomgivande skelettmetastaser, men utan kända visceral metastaser.
- Endast Onkologen remitterar till denna behandling.

Förberedelser

- Lab-värden ska vara godkända – se Metodbeskrivning [Ra223 Xofigo-behandling](#).

Utförande

Endast injektion. Ingen bildtagning.

Kontaktrestriktioner

Se informationsfolder. [Xofigo Pocket treatment guide](#).