





Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 1 av 4
Sammanställning av läkemedel kopplat till undersökningsmetod DT		Gäller för enhet Radiologi SkaS, Lidköping och Skövde Datortomografi	Verksamhetsområde: VO9 BFM
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	2025-11-21
Eva Högström rtgssk/ /Annica Berg Lma ssk	Karin Wennerstrand ÖL	Karin Wennerstrand ÖL	Ersätter tidigare version daterad 2023-04-30

Läkemedel nedan får administreras av Leg sjuksköterska och Leg röntgensjuksköterska.

Läkemedlen får efter introduktion endast administreras enligt av radiolog dokumenterad körkod som angetts i samband med prioritering av röntgenremiss.

Om behov av andra läkemedel uppkommer krävs läkarordination.

Indikation, kontraindikation och anmärkning	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dosering	Adm sätt																
DT Aorta, DT Angio enligt metod Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	380 mg/kg	intravenöst																
DT barn (upp till 16 år) Kontraindikationer: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Visipaque 270 mg/ml Visipaque 320 mg/ml	2 ml/kg Max 100 ml 1,5 ml/kg Max 100ml	intravenöst																
DT barn Peroral kontrast vid undersökning av buk och lilla bäckenet enligt metod. Intages 1 timme före undersökningen. Blandningen dricks med 10 minuters intervaller.	Visipaque 270 mg/ml	Dos till barn: Blanda 20 ml i 1000 ml vatten	per os																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vikt</th> <th>Mängd kontrastmedel till patient</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Under 5 kg</td> <td>10 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>5-10 kg</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td>10-20 kg</td> <td>200 ml</td> </tr> <tr> <td>20-30 kg</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>30-40 kg</td> <td>600 ml</td> </tr> <tr> <td>40-50 kg</td> <td>800 ml</td> </tr> <tr> <td>50 kg och över</td> <td>1000 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Vikt	Mängd kontrastmedel till patient	Under 5 kg	10 ml/kg	5-10 kg	100 ml	10-20 kg	200 ml	20-30 kg	400 ml	30-40 kg	600 ml	40-50 kg	800 ml	50 kg och över	1000 ml			
Vikt	Mängd kontrastmedel till patient																		
Under 5 kg	10 ml/kg																		
5-10 kg	100 ml																		
10-20 kg	200 ml																		
20-30 kg	400 ml																		
30-40 kg	600 ml																		
40-50 kg	800 ml																		
50 kg och över	1000 ml																		
DT Buk enligt metod Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	500 mg/kg alternativ 700 mg/kg	intravenöst																

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 2 av 4
Sammanställning av läkemedel kopplat till undersökningsmetod DT	Gäller för enhet Radiologi SkaS, Lidköping och Skövde Datortomografi	Verksamhetsområde: VO9 BFM	
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign:	Sign: 	Sign: 	2025-11-21
Eva Högström rtgssk/ /Annica Berg Lma ssk	Karin Wennerstrand ÖL	Karin Wennerstrand ÖL	Ersätter tidigare version daterad 2023-04-30

Indikation, kontraindikation och anmärkning	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dosering	Adm sätt
<p>DT buk vuxen enligt metod Peroral kontrast att dricka inför undersökningen enligt metod</p> <p>Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol</p> <p>Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol</p>	<p>Omnipaque 300 eller 350 mg/ml</p> <p>Alternativt: Visipaque 270 mg/ml</p>	<p>20 ml till 1000 ml vatten eller 10 ml till 500 ml vatten</p> <p>20 ml till 1000 ml vatten</p>	<p>per os</p> <p>per os</p>
<p>DT colon enligt metod Administreras enligt metod</p> <p>Kontraindikationer: Prostatahyperplasi med urinretention Stenoser i mag-tarmkanalen Megacolon Takykardi Myastenia gravis Obehandlat trångvinkelglaucom</p>	<p>Buscopan 20 mg/ml</p>	<p>20 mg = 1 ml</p>	<p>intravenöst</p>
<p>DT Hals, DT Ansikte enligt metod</p> <p>DT Hals Angio</p> <p>DT Tyroidea</p> <p>Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol</p> <p>Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol</p>	<p>Omnipaque 350 mg/ml</p> <p>Alternativt: Visipaque 320 mg/ml</p>	<p>450 mg/kg</p> <p>70 ml</p> <p>400mg/kg</p>	<p>intravenöst</p>
<p>DT Hjärta enligt metod</p> <p>DT Tawi</p> <p>Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol</p> <p>Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol</p>	<p>Skövde: Omnipaque 350 mg/ml</p> <p>Alternativt: Visipaque 320 mg/ml</p>	<p>75 ml</p> <p>300 mg/kg</p>	<p>intravenöst</p>

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 3 av 4
Sammanställning av läkemedel kopplat till undersökningsmetod DT	Gäller för enhet Radiologi SkaS, Lidköping och Skövde Datortomografi	Verksamhetsområde: VO9 BFM	
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign:	Sign:	Sign:	2025-11-21
Eva Högström rtgssk/ /Annica Berg Lma ssk	Karin Wennerstrand ÖL	Karin Wennerstrand ÖL	Ersätter tidigare version daterad 2023-04-30

Indikation, kontraindikation och anmärkning	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dosering	Adm sätt
DT Hjärna enligt metod DT Hjärnangio DT Hjärna perfusion DT Orbita/Ansikte Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	450 mg/kg 70 ml 40 ml 380mg/kg	intravenöst
DT Njurar (urografi) enligt metod) DT Njurar (tyst hematuri utredning) enligt metod Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	300 mg/kg 400 mg/kg	Intravenöst
DT Thorax DT Pulmonalis enligt metod Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	320 mg/kg 260 mg/ml Alternativt 200 mg/kg 380 mg/kg	Intravenöst
DT Trauma Kontraindikationer Omnipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Johexol Kontraindikationer Visipaque: Manifest tyreotoxikos Tidigare allvarlig reaktion på Jodixanol	Omnipaque 350 mg/ml Alternativt: Visipaque 320 mg/ml	520 mg/kg	Intravenöst

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 4 av 4
Sammanställning av läkemedel kopplat till undersökningsmetod DT		Gäller för enhet Radiologi SkaS, Lidköping och Skövde Datortomografi	Verksamhetsområde: VO9 BFM
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign:	Sign:	Sign:	2025-11-21
Eva Högström rtgssk/ /Annica Berg Lma ssk	Karin Wennerstrand ÖL	Karin Wennerstrand ÖL	Ersätter tidigare version daterad 2023-04-30

Indikation, kontraindikation och anmärkning	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dosering	Adm sätt
Vid PVK sättning då patient är stickrädd Kontraindikation: Överkänslighet för lokalanestetika av amidtyp.	EMLA kräm		