


| | | | |
|---|-------------|--|--------------------------|
| Dokumentnamn | | Gäller vid | Sidan 1 av 1 |
| Generell ordination av läkemedel i samband med undersökningsmetod | | Gäller för enhet Nuklearmedicin | |
| | | Verksamhetsområde: VO9 BFM Nuklearmedicin | |
| Innehållsansvarig | Granskad av | Godkänd av | Gäller fr o m - t o m |
| Sign: | Sign: | Sign:  | 2024-10-01 2025-09-30 |
| Jannica Berg Lma ssk K1 | | Hans Forssgren ÖL Nuklearmedicin | |

Diazepam Renaudin 5mg/ml 10x2 ml

Tablett Stesolid 5 mg

Denna generella ordination gäller för patienter på ovan definierad enhet.
Läkemedel som anges nedan får administreras av sjuksköterskor,
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
Ordnationen gäller endast i samband med undersökning på Nuklearmedicin.

| Indikation, kontraindikation och anmärkning | Läkemedel, läkemedelsform, styrka | Dos, enhet | Dosering | Adm sätt |
|---|--|------------|-----------|--------------|
| <p>Indikation: Vid behov när patient är orolig i samband med undersökning.</p> <p>Kontraindikationer: Överkänslighet mot Diazepam. Sömnapné</p> | Tablett Stesolid® 5 mg | 5 mg | 1 tablett | Per os |
| <p>Indikation: Vid behov när patient är orolig i samband med undersökning.</p> <p>Kontraindikationer: Överkänslighet mot Diazepam. Sömnapné</p> <p>Patient under 18 år, kontakta alltid läkare för att få en ordination</p> | Diazepam Renaudin 5 mg/ml injektionsvätska | 5 mg | 1 ml | Intra-venöst |