



Råd/information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan.

Till patienter som åter Metforminpreparat.

Du har idag klockan vid röntgenundersökning fått
kontrastmedel.....som en intravenös injektion.

Du får inte inta Metforminpreparat förrän nytt blodprov - kreatinin tagits.
Detta prov skall tas tidigast 48 timmar efter att du fått kontrastmedlet, som är tidigast
den / klockan

Om du ej fått tid för provtagning, tag då kontakt med din remitterande
läkare..... eller vårdcentral/remitterande klinik

Remitterande läkare är den som är ansvarig för att Metformin skall sättas in igen.

Drick efter undersökningen

Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar. För att
underlätta denna utsöndring bör du dricka ett glas (cirka 2 deciliter) vätska var timme så länge
du är vaken under första dygnet efter undersökningen.

OBS! Detta gäller inte om du lider av hjärtsvikt, njursvikt eller annat tillstånd som lett till att
du ordinerats att begränsa ditt intag av vätska.

Allergisk senreaktion

I sällsynta fall kan kontrastmedlen ge upphov till allergisk reaktion, vanligast hudutslag
och/eller klåda, inom något eller några dygn efter undersökningen. I allmänhet är dessa
symtom lindriga och försvinner spontant utan behandling.

Om du mot förmodan skulle få en sådan reaktion (eller något annat symtom) som är
besvärande skall du ringa och meddela oss detta på telefon

Skövde: 0500-43 13 55 eller Lidköping: 0510- 85259

Kan du inte nå oss, ta kontakt med din läkare, sjukvårdsupplysningen, primärvården eller
akutavdelningen. Kom ihåg att berätta att du varit på en röntgenundersökning och fått
röntgenkontrastmedel insprutat i blodbanan.

Röntgensjuksköterska Skövde

Röntgensjuksköterska Lidköping