

Bilägges enhetens läkemedelsinstruktion, bevaras

Dokumentnamn	Gäller vid		
Utsättning av läkemedel T. Levaxin, Tyreostatika och T. Cordarone	SkaS Område VO9 BFM SkaS Nuklearmedicin		Sida 1 av 1
Ersätter tidigare daterad	Utarbetad av:	Godkänd / Fastställd av:	Gäller fr o m-tom
2025-02	Camilla Karlsson	Ana Popescu Överläkare SkaS VO7	2025-02-
	Namnförtydligande och titel: Läkemedelsansvariga ssk	Namnförtydligande, ansvarig läkare:	

Följande läkemedel får sättas ut av sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och sjukhusfysiker på Nuklearmedicinsk mottagning:

Utsättning av Tablett Levaxin, tyreostatika (Tablett Thacapzol, Tablett Tiotil), Tablett Cordarone inför nuklearmedicinsk undersökning av thyroidea.

### **Thyreoidescintigrafi med technetium**

Levaxin utsätts 1 vecka innan undersökning.  
Tyrostatika utsätts 1 vecka innan undersökning.  
Amiodaron (Cordarone) utsätts 3 mån innan undersökning.

### **Spårjodsundersökning och radiojodbehandling**

Levaxin utsätts 1 vecka innan undersökning.  
Tyrostatika utsätts 1 vecka innan undersökning.  
Amiodaron (Cordarone) utsätts 3 mån innan undersökning.



Ana Popescu  
Överläkare