

Parathyroideascintigrafi

Undersökningen avser lokalisera överproducerande bisköldkörtlar på hals alternativt övre bröstorg. Detta görs inför eventuell operation.

Förberedelser

Du kan ta alla dina läkemedel precis som vanligt.

Du bör undvika intag av jodhaltigt salt och hälsokost innehållande havsalger och tång 14 dagar före undersökningen.

Ring och meddela om du är gravid eller ammar.

Så här går undersökningen till

Vi börjar med att sätta en nål i din arm och du kommer få en injektion av ett svagt radioaktivt läkemedel. Efter detta får du en paus på cirka 15 minuter innan bildtagningen startar. Bildtagning sker med en gammakamera och du kommer ligga på rygg med huvudet i ett stöd. Vi fäster ett band om din panna som hjälp att ligga stilla. Direkt efter första bildtagning startar nästa med att du får ytterligare en injektion av ett radioaktivt läkemedel. Denna första omgång av bilder tar cirka 45 minuter. Därefter får du en paus på cirka 30 minuter.

Vid efterföljande bildtagning kommer kameran långsamt rotera runt ditt huvud och överkropp. Slutligen görs en datortomografi över området. Det är viktigt att du ligger stilla under alla bildtagningar. Vid behov tar vi om den sista bildomgången efter ytterligare cirka 1 timma.

Personal kommer finnas i din närhet vid bildtagningen.

Meddela personal på plats om du tycker det är jobbigt med trånga utrymmen.

Tidsåtgång

Total tid för besöket beräknas till cirka 3,5 timmar.