

SeHCAT

Undersökningen avser påvisa eventuellt ökad förlust av så kallade gallsalter via avföring, vilket kan orsaka diarré. Bildtagning sker vid två tillfällen med 1 veckas mellanrum.

Förberedelser

Du ska inte ta läkemedel som binder gallsyra 4 dagar innan undersökning.

Exempelvis Kolestyramin, Questran, Cholestagel.

Du ska inte ta peristaltikhämmande läkemedel från och med första undersökningdagen.

Exempelvis Imodium, Loperamid, Dimor.

Dag 1: Fasta från kl 24.00 (cirka 8 timmar). Du får dricka lite vatten.

Dag 7: Ingen fasta.

Så här går undersökningen till

Du kommer få en svagt radioaktiv kapsel innehållande läkemedel som binder till gallsalter. 1 timma efter att du tagit kapseln ska du äta frukost och 3 timmar efter intaget startar första bildtagningen. Du kommer ligga på rygg i en gammakamera och undersökningen tar cirka 5 minuter. Nästa bildtagning sker efter 1 vecka.

Under veckan mellan bildtagningarna ska du inte ta gallsyrebindande eller peristaltikhämmande läkemedel.

Efter 1 vecka är det dags för nästa bildtagning. Du kommer hit på den morgontid du fått och bildtagningen sker på samma sätt som vid första tillfället.

Personal kommer finnas i din närhet vid bildtagningen.

Tidsåtgång: Total tid för besöket beräknas till cirka 3,5 timmar dag 1 och cirka 10 minuter dag 7.