



Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 1 av 1
Sammanställning av läkemedel kopplat till undersökningsmetod	Gäller för enhet Nuklearmedicin	Verksamhetsområde: VO9 BFM Nuklearmedicin	
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller from
Sign:	Sign: 	Sign: 	250501- 260430
/Annica Berg Lma ssk BFM	Lisa Brandin ÖL Kardiolog	Lisa Brandin ÖL Kardiolog	Ersätter tidigare version 220240501-250430

Läkemedel som anges nedan får administreras av Leg sjuksköterska, Leg röntgensjuksköterska och Leg biomedicinsk analytiker.

Läkemedlen får efter introduktion endast administreras enligt godkänd undersökningsmetod inom Nuklearmedicin.

Om behov av andra läkemedel uppkommer krävs läkarordination.

Indikation, kontraindikation och anmärkning	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos, enhet	Dosering	Adm sätt
<p>Indikation: I samband med viloregistrering av myokardscintigrafi. Ges endast om patienten har symtom i form av bröstsmärta.</p> <p>Minimera sannolikhet för kärlkramp.</p> <p>Kontraindikation: Viagra får ej tas inom ett dygn innan.</p> <p>Anmärkning: Kan ge blodtrycksfall. Blodtrycket behöver dock inte kontrolleras vid undersökningen</p>	Glytrin Sublingualspray 0,4 mg/dos	0,4 mg/dos	<p>1 dos (puff) - 0.4 mg under tungan.</p> <p>Alternativt 2 doser (puffar) - 0.8 mg på tungan.</p> <p>En gång/undersökning 2 min före radiofarmakainjektion</p>	Sublinguallt