

Har du frågor?

Dysfagienheten

Sjuksköterska Veronika Gustafsson Hagelberg

Telefon: 0500-43 16 12

Lättast att nå tisdagar och onsdagar. Om ej i tjänst, lämna namn och telefonnummer så återkommer vi.

Förskrivning av sondnäring kontakta ansvarig dietist.

För uttag/beställning av förskrivna produkter

Ring Skövdedepån 010 -441 31 90

Vid akuta besvär som inte kan vänta:

Rådgivning sjuksköterska Öron-, näs- och halsmottagningen (ÖNH):

(Gemensamt för alla ÖNH - mottagningar)

Telefon: 0500-44 70 10

Måndag – torsdag kl. 08:00 – 10:30, 13:00 – 14:30,
fredag kl. 08:00 – 10:30

Kirurgmottagningens rådgivning

Skövde: 0500 – 43 20 75, måndag – fredag 08:00 – 09:30

Lidköping: 0510 – 850 60, måndag – fredag 08:00 – 09:30

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon: 1177 (kvällar, nätter och helger).

Medicinskt ansvarig läkare: Martin Oscarsson, ÖNH, Tomas Manke, Kirurgi.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska: Veronika Gustafsson Hagelberg

Skaraborgs Sjukhus

Information till dig som har gastrojejunal infart

Din enterala infart heter _____

Och är av storlek _____ Fr _____ cm _____ cm

Kuffen är fylld med _____ ml vatten / Har ingen kuff _____

Omcaffning var _____ dag

Öron-, näs- och halskliniken
Kirurgkliniken
Skaraborgs Sjukhus

Bakgrund

En gastrojejunalinfart används till dig som har behov av sondnäring och har svårigheter med tarmpassagen på något sätt eller behöver ta speciella läkemedel. Oftast har man haft en knapp eller gastrotub tidigare innan man byter till gastrojejunalinfart men det förekommer även att man sätter infarten direkt. Här nedan finns exempel på varianter av förlängning till tunntarmen, en knappvariant och en gastrotubvariant. Förekommer även med PEG-variant och förlängning till tunntarmen. På framsidan finns information om vilken typ av infart du har. Vid tillförsel av sondnäring och vätska eller mediciner bör du alltid sitta upp eller inte ha huvudändan lägre än 30 grader.

Gastrojejunal infart

Gastrojejunal infart är en infart som går mellan huden på magen in till magsäcken och har en förlängning därifrån som går till tunntarmen, hålet kallas gastrostoma. På insidan sitter gastrotuben fast med en ballong kallad kuff som fylls med vatten. Hur mycket vatten beror på infart, står på förpackningen vanligen 7-10 ml. Kontroll av kuffen rekommenderas att göras varje till varannan vecka med en 10 ml spruta.

Har du en PEG-variant finns ingen kuff. Invändigt finns en stopplatta och utvändigt en trekantig del som håller slangen på plats. Trekantsdelen ska med regelbundenhet släppas på och puttas in 2 cm. Kan göras i samband med rengöring. Den har en ingång till magsäcken vid sidan men kan bero på vilken variant man har. Centrerat finns en del till tunntarmen (jejunum). Till knappvarianten kopplas kopplingslangar på respektive infart där en går direkt till tunntarmen (jejunum) och den andra på sidan går till magsäcken (gastric).

Gastrotubvarianten har också två olika ingångar en till tunntarmen och en till magsäcken. Till gastrojejunal gastrotub behövs adaptrar, förskrivs av sjuksköterska. Båda varianterna har en kuffingång.




Mic-Kej Gastrojejunal knapp



Mic-transgastrisk jejunal tub



Kopplingslang



Material

Underlag för beställning görs av behörig sjuksköterska. Uttag kan skapas av patient/anhörig/sjuksköterska. Själva infarten finns på dysfagienheten efter beställning om inget annat är överenskommet.

Sondnäring förskrivs och ordineras av dietist. Uttag kan skapas/beställas av patient/anhörig/sjuksköterska.

Pump förskrivs av sjuksköterska samt ryggsäck finns att tillgå.

Kontroller / skötsel

Läckage från gastrostomat kan förekomma. Det innebär att magsaft kan läcka ut via gastrostomat. Viktigt att avlägsna läckage av vätska då det kan fräta på huden.

Ta kontakt med ansvarig sjuksköterska vid stora läckage.

- Kontroll och rengöring av gastrostomat ska göras dagligen.
- Om infarten är vilande/inte används till sondnäring eller läkemedel ska den spolats igenom dagligen med 20-50 ml vatten.
- Före och efter tillförsel av sondnäring och läkemedel spola med 20-50 ml vatten. Gäller även mellan olika typer av läkemedel.
- Läkemedel ska ges i flytande form, tabletter som själva löses upp i vatten eller krossade och lösta i vatten. Läkemedel ges vanligen i gastricdelen.
- Sprutor är flergångsmaterial i hemlik miljö och diskas enligt rekommendation från företaget och byts var 7-14:e dag.
- Om obehag eller smärta upplevs i samband med matning, ta kontakt med ansvarig sjuksköterska eller 1177.
- Byte av själva infarten utförs var 3:e månad på operation eller IVC (röntgen), eller med längre intervaller efter läkarordination.
- Om infarten skulle åka ut eller ballongen skulle gå sönder så stoppa ner den i gastrostomat igen och kontakta därefter ansvarig sjuksköterska.