

Har du frågor?

Dysfagienheten

Sjuksköterska Veronika Gustafsson Hagelberg

Telefon: 0500-43 16 12

Lättast att nå tisdagar och onsdagar. Om ej i tjänst, lämna namn och telefonnummer så återkommer vi.

Förskrivning av sondnäring kontakta ansvarig dietist.

För uttag/beställning av förskrivna produkter

Ring Skövdedepån 010 -441 31 90

Vid akuta besvär som inte kan vänta:

Rådgivning sjuksköterska Öron-, näs- och halsmottagningen (ÖNH):

(Gemensamt för alla ÖNH - mottagningar)

Telefon: 0500-44 70 10

Måndag – torsdag kl. 08:00 – 10:30, 13:00 – 14:30,
fredag kl. 08:00 – 10:30

Kirurgmottagningens rådgivning

Skövde: 0500 – 43 20 75, måndag – fredag 08:00 – 09:30

Lidköping: 0510 – 850 60, måndag – fredag 08:00 – 09:30

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon: 1177 (kvällar, nätter och helger).

Medicinskt ansvarig läkare: Martin Oscarsson, ÖNH, Tomas Manke, Kirurgi.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska: Veronika Gustafsson Hagelberg

Skaraborgs Sjukhus

Information till dig som har gastrotub

Din gastrotub heter _____

Och är av storlek _____Fr

Kuffen är fylld med _____ ml vatten

Omkuffning var _____ dag

Öron-, näs- och halskliniken
Kirurgkliniken
Skaraborgs Sjukhus

Bakgrund

En gastrotub används till största del för dig som behöver hjälp med näringsintag då det är svårt att svälja mat och/eller ta mediciner. Oftast får man en PEG först för att vanligtvis byta till en knapp eller gastrotub om behovet kvarstår. Här intill finns exempel på två varianter av gastrotuber.

Vid tillförsel av sondnäring, näringsdryck och vätska eller mediciner bör du alltid sitta upp eller inte ha huvudändan lägre än 30 grader.



Mic-Bolus gastrotub



Compat gastrotub

Gastrotub

En gastrotub är en infart som går mellan huden på magen in till magsäcken, hålet kallas gastrostoma. På insidan sitter gastrotuben fast med en ballong så kallad kuff som fylls med vatten. Hur mycket vatten varierar på produkt, det står på förpackningen, vanligen 7-10ml. Kontroll av kuffen rekommenderas att göras varje eller varannan vecka. På utsidan finns en justerbar stopplatta som anpassas till lämpligt avstånd.

Läckage från gastrostomat kan förekomma. Det vill säga att sondnäring och magsaft kan läcka ut via gastrostomat. Viktigt att avlägsna läckage då det kan fräta på huden. Ta kontakt med ansvarig sjuksköterska vid stora läckage.

Material

Underlag för beställning görs av behörig sjuksköterska och uttag kan skapas av patient/anhörig/sjuksköterska.

Sondnäring förskrivs och ordinerar av dietist. Uttag kan skapas/beställas av patient/anhörig/sjuksköterska.

Kontroller/Skötsel

Läckage från stomat kan förekomma. Det vill säga att sondnäring och magsaft kan läcka ut via stomat. Viktigt att avlägsna läckage då det kan fräta på huden.

Ta kontakt med ansvarig sjuksköterska vid stora läckage.

- Kontroll och rengöring av gastrostomat ska göras dagligen. Vi rekommenderar smörjning med barriärsalva, till exempel Cavilon
- Om gastrotuben är vilande/inte används till sondnäring eller läkemedel ska den spolats igenom dagligen med 20-50 ml vatten.
- Omkuffning sker med 10 ml spruta och kranvatten var 7-14:e dag.
- Före och efter tillförsel av sondnäring och läkemedel, spola med 20-50 ml ljummet vatten. Gäller även mellan olika typer av läkemedel.
- Läkemedel ska ges i flytande form, tabletter som själva löses upp i vatten eller krossade och lösta i vatten
- Sprutor är flergångs i hemlik miljö och diskas enligt rekommendation från företaget och byts var 7-14:e dag.
- Om obehag eller smärta upplevs i samband med matning, ta kontakt med ansvarig sjuksköterska eller 1177.
- Byte av själva infarten utförs var 3:e månad. Kan göras av patient/anhörig eller sjuksköterska.
- Om gastrotuben skulle åka ut eller ballongen skulle gå sönder, så stoppa ner den i gastrostomat igen och kontakta därefter ansvarig sjuksköterska.