

Har du frågor?

Angående sövningen

Telefon: 0500-47 36 80 mellan 10.30–11.00

För ombokning och avbokning av operationstider

kontakta sekreterare telefon: 0500-43 16 14

Öron-, näs- och halsavdelningen 82

Måndag-torsdag kl. 08.00-15.30

Fredag kl. 08.00-12.00

Rådgivning sjuksköterska

Öron-, näs- och halsmottagningen (ÖNH)

(Gemensamt för alla ÖNH - mottagningar)

Telefon: 0500-44 70 10

Måndag-torsdag kl. 08.00-10.30 och 13.00–14.30

Fredag kl. 08.00-10.30

Sjukvårdsrådgivningen

(kvällar, nätter, och helger)

Telefon: 11 77

Vad händer när man kommer som barn till sjukhuset för att opereras?

Se barn information på webbadress.

<http://www.vgregion.se/skas-barn-dagkirurgi>

Information inför operation av körtel bakom näsan Skaraborgs Sjukhus Skövde

Öron-, näs- och halskliniken SkaS



Medicinskt ansvarig läkare Martin Oscarsson
rev. 2023-08-25 rev. 2024-09-18

Bakgrund

Körteln bakom näsan finns i varierande storlek hos alla barn. Körteln kan orsaka nästäppa, snarkningar och ibland ge kvarstående vätska bakom trumhinnan.

Före operationen

Man bör helst inte ha en pågående infektion vid operation. Ring till öronmottagningen vid t ex förkylning, feber eller andra nytillkomna symtom. Telefonnummer finns på sista sidan.

Att göra inför operation

Fasta 6 timmar före operationen

Barnet ska vara fastande inför operation, vilket innebär att de inte får äta någon fast föda eller dricka mjölkprodukter sex timmar innan operationen. Detta är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Tuggummi, snus och rökning ska också undvikas. Drick gärna vatten, saft eller kaffe/te utan mjölk, fram till två timmar innan operationen.

Innan ni åker till sjukhuset sätter ni på fyra Emla-plåster (bedövning av hud inför nålsättningen).

Sätt Emla-plåstern i båda armvecken och på båda handryggar. (se bild).

Emla-plåster inhandlas receptfritt på apoteket.

Medtag förälders legitimation.



Hur går operationen till?

Ni är på sjukhuset bara över dagen. Under operationen är man sövd. Då barnet har sövts får du som förälder lämna operationssalen. Ett instrument håller munnen öppen under operationen. Detta kan någon gång klämma tunga, läpp och framtänder. Körteln skrapas bort via munnen och på dess plats lämnas ett öppet sår som läker spontant.

Efter operationen

Efter operationen får man stanna kvar några timmar på sjukhuset tills man är vaken och kan stå på sina ben.

Efterförlopp

Ibland gör det lite ont, men det brukar räcka att ge paracetamol t ex Alvedon. Första dygnet brukar flytande och mjuk kost gå bäst. Lätt feber, under 38,5 grader, är vanligt det första dygnet efter operationen. I sällsynta fall kan man få en infektion i operationssåret. Tecken på detta kan vara kvarstående feber och smärta. Någon enstaka gång kan man få blödning från såret. Kontakta öron-, näs- och halskliniken eller Sjukvårdsrådgivningen om det sker under kvällar, nätter eller helger. Vi rekommenderar att man stannar hemma från skola/dagis en-två dagar efter operationen.

Kontroller

Behövs inte.