

## Checklista ovarialcancer

För patienter som utreds enligt SVF vid välgrundad misstanke eller diagnostiserad ovarialcancer

Start av SVF görs av gynekolog vid välgrundad misstanke. Se **rutin ingång SVF**.

Diktera SVF-start/ovarial VH410 + ge patienten informationsbroschyr SVF + högprioritera diktat.

### Utredning

- Anamnes inkl funktionsanamnes och status inkl nll, cor/pulm, gyn-us \_\_\_\_\_
- Blod-/el-/leverstatus, Ca 125, CEA, HE4 om kvinnan är premenopausal, blodgruppering \_\_\_\_\_
- Längd/vikt/blodtryck \_\_\_\_\_
- Ev MBR-screen \_\_\_\_\_
- Ev EKG \_\_\_\_\_
  
- Beställ CT thorax/buk. Märk SVF. Diktera "Gyn.onk.mott" som remissavdelning \_\_\_\_\_
- Ta ställning till ytterligare provtagning. Märk SVF  
- cytolog från ascites/pleuravätska  
- mellannål/punktion lymfkörtlar \_\_\_\_\_
- Ta ställning till behov av ytterligare preop konsultutredning, medicin-/kardiologkonsult, anestesibedömning, gastro-/koloskopi \_\_\_\_\_
- Om kvinnan är < 40 år och vid misstanke på icke epitelial äggstockstumör, ta ställning till: AFP, beta-HCG, inhibin, AMH, alt serumprov för frysning \_\_\_\_\_
- Preliminär Orbitanmälan FF—F. Vid behov telefonkontakt operationskoordinator 314 17 \_\_\_\_\_

### Vid misstänkt stadie III—IV:

- Telefonkontakt Gynnaläkare 314 24 vid behov för hjälp
- Remiss KK SU tumörteam för ev MDK faxas, 031-41 93 61
- Ev telefonkontakt tumörkirurg KK SU
- Ställningstagande till Fragminprofylax preop
- Ev subkutan venport

## Efter beslut MDK

- Op KK SU:
- Patienten informeras
  - Kontaktsköterska och PAL gyn.onk.mottagningen
  - Operationskoordinator informeras
  - [Diktera avslut SVF](#) och överflyttning SVF till SU
- Op KK Skövde:
- Patienten informeras
  - Operationskoordinator informeras
- Neoadjuvant cytostatika:
- Patienten informeras
  - PAL och kontaktsköterska gyn.onk.mottagningen
  - Iohexolclearance. Märk SVF
  - Gyn.onk.mottagningen informeras
  - Diktera avslut SVF, första behandling neoadjuvant cytostatika VH452
- Palliativ vård:
- Patienten informeras
  - Kontaktsköterska och PAL gyn.onk.mottagningen
  - Operationskoordinator informeras
  - Ev Iohexolclearance. Märk SVF
  - [Diktera avslut SVF](#), första behandling palliativ VH458
  - [Diktera avslut SVF](#) första behandling läkemedel VH452

## Övrigt

- Diktera avslut SVF = operationsdatum vid operation i Skövde (VH450)
- Patientpärm lämnas
- Ev nutritionsbehandling
- Pneumokockvaccin
- Bevakning av PAD-svar via gyn.onk.mottagningen
- JK-brev vid utskrivning efter operation i Skövde vid stadie 3 annars vid PAD-svar Remiss Iohexolclearance. Märk SVF
- Om PAD: BOT, remiss eftergranskning referenspatolog SU
- Om PAD: ovarialcancer - alla remitteras till SU för ställningstagande till utvidgad op eller cytostatika + INCA-reg
- Vid PAD-svar seropapillär, endometroid el klarcellscancer samt carcinosarkom, remittera för BRCA-/HRD-analys på tumörvävnad om det ej är gjort
- Avför från GCK om kvinnan är  $\leq 70$  år och total hysterektomi gjorts samt om kvinnan är äldre och ingår i kontrollfil efter behandling eller kontrollfil HPV (Brev Gyn17)
- Om PAD: inte cancer eller BOT: diktera avslut SVF, misstanke om cancer av skrivs VH478