

Checklista vulvacancer

För patienter som utreds enligt SVF vid välgrundad misstanke eller diagnostiserad vulvacancer

Start SVF görs av gynekolog vid stark klinisk misstanke vid gynekologisk undersökning eller PAD-verifierad vulvacancer eller malignt melanom i vulva. Se **rutin ingång SVF**.

Diktera SVF-start vulva VH410 + ge patienten informationsbroschyr SVF + högprioritera diktat.

Utredning/åtgärder vid start SVF

- Gynekologisk undersökning med inspektion och palpation av vulva, perineum, vagina, portio och ljumskar. Dokumentation av tumörutbredning, avstånd till uretra, vagina, anus och medellinjen.
- Fotodokumentation i Picsara (via kolposkop)
- Biopsi av alla dysplasi- och cancermisstänkta förändringar. Dokumentation var biopsin är tagen (på skiss på PAD-remiss eller foto). Märk PAD-remissen SVF.
 - Stansbiopsi 4 mm, 4-5 mm djup, perifert lesionen
 - Efterfråga invasionsdjup $<$ eller \geq 1 mm
 - Smärtlindring efter biopsi (Tapin, OxyNorm, paracetamol)
 - **OBS! Ta aldrig bort hela förändringen!**
- Cellprov från portio med analys av celler och HPV. Märk SVF.
- Allmän, social och aktuell anamnes. Läkemedel, klarar patienten narkos?
- Klinisk undersökning inklusive blodtryck, puls, längd och vikt
- Ev MBR-screen, EKG, anestesi-/medicinkonsult
- Bilddiagnostik. Diktera "gyn.onk.mott" som remissavdelning
 - Misstänkt invasionsdjup \geq 1 mm, tumör $<$ 4 cm eller palpabel resistens i ljumskan: remiss ultraljud ljumskar med möjlighet till finspetspunktion av ultraljudsmisstänkta lymfkörtelmetastaser. Märk SVF.
 - Tumör \geq 4 cm eller misstanke på överväxt på intilliggande organ: MRT lilla bäckenet och ljumskar. Märk SVF.
 - Tumör \geq 4 cm, lymfkörtelmetastas eller annan misstanke på metastasering: DT buk/thorax.
- Remiss via fax till tumörteamet KK SU. PAD-svar inväntas inte.

Vid svar PAD på klinisk misstanke

- PAD-svar faxas som komplement till tidigare remiss
- Om infiltrationsdjup inte kan avgöras: ordna för tårtbitsexcision
- Kompletterande bilddiagnostik enligt ovan vid behov
- [Diktera avslut SVF](#) om cancermisstanke avskrivs (VH078)

Efter beslut KK SU/nMDK

- Patienten informeras av PAL
- [Diktera avslut SVF](#) enligt nästa sida

Övrigt

- Vid PAD-besked
 - Kontaktsköterska gyn.onk.mottagningen
 - Definiera PAL
 - Ge informationsbroschyr
 - Information om rökstopp inför operation/strålbehandling
 - Anmälan INCA
 - Information om att ordna handdusch om det inte finns i hemmet.

Diktat inklusive datum vid avslut SVF vulvacancer

- "Avslut SVF, misstanke om cancer avskrivs" VH078
- "Avslut SVF och överflyttning SVF SU" eller
- "Avslut SVF start av första behandling, kirurgi i Skövde" VH050
- "Avslut SVF och start palliativ vård" VH058