


Patientinformation- njurbiopsi

Vad är en njurbiopsi?

En njurbiopsi är ett vävnadsprov från en njure. Med en speciell nål tas 2 till 3 pyttesmå bitar av njuren. Läkaren siktar med ultraljud för att sticka på rätt ställe. Undersökningen görs i sövning på röntgen-avdelningen.

Vävnadsbitarna skickas till ett laboratorium i Göteborg. Här tittar en specialiserad läkare (patolog) i mikroskop på uppbyggnaden av vävnaden och letar efter sjukdomstecken.

Under tiden av ingreppet sover du/ditt barn.



Förberedelser

Om Du/Ditt barn tar blodförtunnande läkemedel eller Ipren, behöver detta pausas några dagar innan biopsin. Din/ Ditt barns läkare anger längst ned på detta informationsblad om det är aktuellt.

Dag 1: Du/Ditt barn blir inlagd på barnavdelningen dagen innan vävnadsprovet för förberedelser. (Om vävnadsprovet är planerat för sen eftermiddag görs nedanstående samma dag.)

- Inskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska
- Bedömning av narkosläkare inför sövning
- Du/Ditt barn behöver duscha på kvällen
- Du/Ditt barn får en tunn plastslang (infart) insatt i ett blodkärl på armen och blodprover blir tagna
- Kontroller av bland annat längd, vikt och blodtryck
- Du/Ditt barn behöver lämna in ett urinprov

Dag 2, innan biopsi:

- Du/Ditt barn får inte äta eller dricka enligt ordination av personal i några timmar innan vävnadsprovet görs.
- Du/Ditt barn behöver lämna in ett morgonurinprov.
- Nya kontroller av bland annat hjärtfrekvens och blodtryck.
- Du/Ditt barn får Alvedon ungefär 1 timme innan vävnadsprovet och eventuellt även lugnande läkemedel (på ordination av narkosläkare).
- Innan transport till operationssalen/röntgen får du/ditt barn vätskedropp och du/ditt barn behöver kissa en gång till.
- Du/ditt barn sövs innan vävnadsprovet görs.

Efter biopsi/vävnadsprovet

Dag 2, efter biopsi:

- Du/Ditt barn behöver ligga platt i sängen i totalt 6 timmar. Första timmen på den sida som vävnadsprovet togs, därefter får du/ditt barn även ligga i en annan position.
- Du/Ditt barn får börja dricka 1 timme efter vävnadsprovet (ej kolsyrat), och börja äta 2 timmar efter vävnadsprovet.
- Personal gör kontroller regelbundet för att upptäcka eventuella komplikationer tidigt.
- Du/Ditt barn har ett yttre tryckförband på instickstället som behöver sitta kvar 7–8 timmar tills personal tar bort det. Närmast huden sitter steristrips-tejp och ett transparent plåster som ska sitta kvar längre.
- Varje gång du/ditt barn kissar ska urinprov lämnas till personal.
- Några timmar efter vävnadsprovet tas ett blodprov igen.

Dag 3: På denna dag blir du/ditt barn utskriven från barnavdelningen om det inte har uppstått komplikationer.

- Du/Ditt barn behöver lämna in ett sista urinprov
- Personal tar bort infarten
- Avdelningsläkaren undersöker dig/ditt barn och beslutar om du/ditt barn får åka hem

Allmänna instruktioner efter hemgång

- I stickområdet kan det vara lite ömt. Det är inte farligt. Vid kraftiga smärtor i buk eller rygg första veckan efter vävnadsprovet behövs akut kontakt med vården.
- Du/Ditt barn behöver hålla sig i stillhet under första dagarna och får inte idrotta eller liknande i minst 7 dagar.
- Steristrips och transparent plåster får tas bort 8 dagar efter vävnadsprovet.

Komplikationer

Det är ovanligt att få en komplikation efter en njurbiopsi. I enstaka fall kan det uppstå en blödning i njuren. Det slutar oftast blöda av sig själv.

När får jag svar?

Det kan ta några veckor innan din behandlande läkare får svar. I akuta fall kan det gå fortare. Din läkare kontaktar dig via telefon eller bokar ett återbesök.

Eventuella läkemedel som behöver pausas och när?

.....
.....
.....

.....
.....