

# PATIENTINFORMATION

**Till Dig som har eller har haft behandling med sköldkörtelhormon, tablett Levaxin, eller har kontrollerats på grund av:**

- operation av sköldkörteln
- medfödd eller senare uppkommen sköldkörtelunderfunktion (Hypothyreos)
- pubertetsstruma eller annan sköldkörtelsjukdom

## Viktig information

I samband med graviditet ökar vanligen ämnesomsättningen och kroppen har ett ökat behov av sköldkörtelhormon. Det är viktigt för både moderns välbefinnande och för fostrets normala utveckling redan under tidigt fosterliv att Levaxintillförseln är väl avvägd. Ett ökat behov finns också hos modern när hon ammar, detta för att undvika trötthet.

För de flesta kvinnor med Levaxinbehandling innebär det att **Levaxindosen behöver ökas under graviteten och amningsperioden.**

Detta innebär att när Du i framtiden blir gravid eller ammar ska du göra extra **kontroller av sköldkörtelfunktionen** för att kunna justera Levaxindosen så att vare sig underbehandling eller markant överbehandling sker. Även Du som klarat Dig utan Levaxin en tid, kan behöva det igen under graviditet och amning. Dessa kontroller kan antingen ske på mödravårdscentralen eller hos den läkare som sköter din medicinering. Första kontrollen bör ske redan vid det tillfälle då **graviditeten konstateras** och den behöver upprepas under graviditeten.

2011-10-05  
Endokrinteamet  
Barn- och Ungdomsmedicin  
Skaraborgssjukhus