

Remiss för insättning av Trombyl

Behandlingen bör starta omkring graviditetsvecka 12. Patienten ska ta 75 mg Trombyl till kvällen dagligen fram till vecka 36.

Kryssa i de aktuella riskfaktorerna i listorna nedan. Meddela patienten att e-recept kommer att finnas på apoteket om en vecka. Patienten kan även logga in på 1177 eller på respektive apotekskedja för att se om receptet är klart.

Profylax ges till samtliga som har en av följande riskfaktorer:

- ☐ Autoimmun sjukdom såsom SLE eller APLS (antifosfolipidsyndrom).
- ☐ Tidigare preeklampsi.
- ☐ Tidigare graviditetshypertoni med debut eller förlossning före graviditetsvecka 34 eller med IUGR eller IUFD eller med ablatio.
- ☐ Pregestationell diabetes (typ 1- eller typ 2-diabetes).
- ☐ Flerbörd.
- ☐ Kronisk njursjukdom.
- ☐ Kronisk hypertoni.
- ☐ Äggdonation.

Profylax övervägs vid minst tre av följande måttliga riskfaktorer:

- ☐ Nullipara.
- ☐ Förstagradshereditet för preeklampsi.
- ☐ BMI > 30.
- ☐ Ålder > 40 år.
- ☐ Graviditetsintervall > 10 år.
- ☐ Systoliskt blodtryck > 130 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck > 80 mmHg vid inskrivning.
- ☐ Afrikansk etnicitet.
- ☐ Verifierad obstruktiv sömnapné.
- ☐ "White coat hypertension" (upprepad hypertoni vid blodtryck tagna på sjukhus men normala blodtryck registrerade i hemmet).
- ☐ Tidigare graviditetshypertoni med debut efter 34 graviditetsveckor.

Remissen skickas till:

Specialistmödravården
Kvinnokliniken
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde

Avsändare:

Namn: _____

Direkttelefonnr: _____

Mottagning: _____

Datum: _____