

Klinik, avd

Sida

Pat-ID

# Intravenöst insulin Fas 4

Datum

### Blodsocker:

Måste tas varje timma, även på natten! Använd separat kanyl i annan extremitet än droppet.

### Insulin:

50 E (=½ ml) insulin (Humalog/Novorapid/Lispro) blandas i 49,5 ml 0,9 % NaCl-lösning, vilket ger 1 E/ml, som ges intravenöst med IVAC-pump.

### Måltid:

Vid frukost, lunch och middag öka insulinet till (0,15-) 0,2 E/kg i en timme, därefter enligt blodsockersvar. Vid kvällsmål ges måltidsdos i 30 minuter.

Måltidsdos ..... E/tim i en timme.

### Hypoglykemi:

Vid blodsocker < 3 mmol/l stäng av insulinet i max 10-15 min, dosera sedan enligt blodsockersvar.

### Avslutning:


Ge planerad dos direktverkande insulin till maten när barnet ska äta. Den intravenösa insulintill-förseln avslutas cirka 1 timme senare (dosera även nu enligt nomogrammet).

### Nollställning:

Nollställ pumpen varje morgon kl 08 och läs av given mängd insulin totalt under dygnet:

..... E från kl ..... till kl .....

B-glukos  
mmol/l




Uträknad  
E/timme  
utifrån vikt

\_\_\_\_\_ Sign läk \_\_\_\_\_

Vikt \_\_\_\_\_ kg

B-glukos  
mmol/l



KI 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 06

E/tim  
jämn tim

\_\_\_\_\_

E/tim  
ojämn tim

\_\_\_\_\_

Sign ssk

\_\_\_\_\_

Ketoner

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—