



Handoperation

Mottagningsoperation

Av olika anledningar kan en handoperation behöva göras vid tex borttagande av en hudförändring. För att göra detta på ett enkelt och effektivt sätt är du uppsatt för operation på ortopedimottagningen. Besöket med operation tar en timma och du kan gå hem direkt efter ingreppet om du mår bra.

Operationen

Operationen görs i lokalbedövning. **Du ska inte vara fastande.** Under ingreppet stängs ofta blodflödet av i handen med hjälp av en blodtrycksmanschett. Efter att hudförändringen tagits bort sys huden ihop och du får ett mjukt förband på handen. Du ska hemma, innan operationen, duscha med bakteriedödande tvål enligt bifogade instruktioner.

Du kan ta dina mediciner som vanligt på operationsdagen, men om du tar blodförtunnande läkemedel följer du den information du fått, kontakta oss om du har några frågor.

Om du är allergisk mot lokalbedövning eller om du känner dig väldigt orolig och tror att du har behov av lugnande medicinering eller sövning vid operationen måste du höra av dig till oss för ombokning till operation på operationsavdelningen.

Efter operationen

Du ska inte köra bil hem själv efter operationen då du måste hålla handen högt (ovan härthöjd) för att undvika svullnad. Böj och sträck fingrarna minst tio gånger varje timma vaken tid. Använd handen till lättare göromål, men undvik tyngre belastning i två veckor efter operationen. Du får med dig träningsinstruktioner hem efter operationen.

Smärtlindring

Vi rekommenderar att du tar Alvedon före operationen tillsammans med det du önskar äta. Fortsätt med Alvedon regelbundet (enligt rekommenderad dos på förpackningen) under de första dagarna efter operationen eller vid behov. Ta inte medicinen om du är allergisk mot denna eller om du blivit tillsagd av läkare att inte använda denna medicin.

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden efter ingreppet varierar beroende på vilken typ av arbete du har, oftast mellan 1-3 veckor.

Hygien

Förbandet får inte bli blött. Använd en plastpåse över förbandet i samband med dusch. Du kan duscha som vanligt dagen efter att stygnen är borttagna.

Kontroll av såret hos distriktssköterska

Kraftiga smärtor kan tala för att förbandet sitter för hårt. Kontakta sjuksköterska på ortopedimottagningen eller vänd dig till distriktssköterskan på vårdcentralen, för kontroll av förbandet.

Det finns alltid en liten risk för sårinfektion efter operationen. Om du misstänker detta (ökande smärta, rodnad, svullnad eller sårvätskning) ska du kontakta sjukvård för kontroll. Om allt känns bra och successivt går åt rätt håll efter operationen skall bandaget sitta på tills stygnen tas bort efter 10-14 dagar. Därefter kan du använda ett enkelt plåster under några dagar.

Återbesök till läkare

Läkarbesök krävs i regel inte. Uppföljning sker i normalfallet hos distriktssköterska på vårdcentralen.

Operationsresultatet

Förväntningar är att man återfår normal rörlighet i det opererade fingret inom några veckor. Det kan finnas en svullnad och ömhet i operationsområdet under några månader efter ingreppet. Om du får problem att komma igång med handen efter operationen ska du i första hand kontakta arbetsterapeut på din vårdcentral, inom ett par veckor, för hjälp med träning.

Kontakta oss

Telefonnummer 0510-851 21. Du kan även kontakt oss via 1177 e-tjänster.

Knappval 1 (sekreterare)

Nybesök, tidsbokning, recept, intyg och journalkopior

Öppet måndag-fredag kl 8.00-10.00

Knappval 3 (sjuksköterska)

Medicinsk rådgivning

Öppet måndag och torsdag kl 7.30-11.00

Vid medicinska problem övriga tider kontakta sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer 1177