



STICK- & SKÄRSKADA ÅTGÄRDER VID EXPONERING AV BLOD



SKADAD HUD: Desinfektera (alkoholbaserat desinfektionsmedel)

STÄNK I MUNNEN: Skölj (alkoholbaserat desinfektionsmedel, kranvatten)

STÄNK I ÖGON: Skölj (ögondusch, NaCl, kranvatten)

CHECKLISTA FÖR PERSONAL

1. BEDÖMNING OCH PROVER

- Kontakta ansvarig läkare för smittsamhetsbedömning av patient och ev. postexpositionsprofylax för personal (se Vårdhandboken).
- Vid varje tillbud/skada tas prov på den inblandade patienten och utsatt personal. Detta kan ske på den egna arbetsplatsen.
- Vid okänd smittkälla, se punkt 3.**

Patient:

- Informera patient och inhämta medgivande till provtagning. Dokumentera i journal.
- BE EN KOLLEGA** utföra provtagningen.
- Beställ provtagning; S-HBsAg, S-antiHBc, S-anti HCV, S-HIV ag/ak.
- Markera provet med akutsvar och telefonnummer. Skriv kommentar: "Stickkada från denna patient till personal".
- Skicka provet till Unilabs Skaraborgs Sjukhus.

Personal:

- 0-prov (1 serumrör) tas på den utsatta personalen.
- PERSONALENS PROV SPARAS I KYL.**
- Invänta/bevaka patientens provsvar.
- Skriv avvikelse- och skadeanmälan.

2. NEGATIVT PROVRESULTAT

- Är patientens prov negativt avslutas utredningen.
- PERSONALENS 0-PROV KASSERAS.**

3. POSITIVT PROVRESULTAT/ OKÄND SMITTKÄLLA

Är patientens prov positivt, om det inte kunnat analyseras eller om smittkällan är okänd

Personal:

- Ansvarig läkare från vårdcentralen kontaktar infektionsläkare.
- Infektionskliniken tar nu över ansvaret för personalen, som nu blir patient.
- Personalens prov skickas för analys.
- Infektionsmottagningen är svarsomtagare och ansvarig infektionsläkare ska stå som ordinator av proverna.
- Beställ provtagning: S-HBsAg, S-antiHBs, S-anti HCV, S-HIV ag/ak. Markera provet med akutsvar och telefonnummer till infektionsmottagningen/jouren.