

# Checklista vårdhygieniska riskfaktorer SkaS

## Hud

- Skadad hud eller slemhinna
- Sår
- Abscess/böld
- Eksem
- Hudsjukdom
- Hudutslag, speciellt i samband med feber
- Dränage
- Infarter/Kärlkateter
- Konstgjorda kroppsöppningar

## Utsöndringar

- Diarré
- Avföringskontinens
- Stomi
- Kräkning
- Urinvägs-/Urinavledningskatetrar
- Urininkontinens
- Blod och andra kroppsvätskor

## Kognitiv förmåga

- Svårighet att förstå och följa instruktioner

## Luftvägar

- Hosta
- Förkylningssymtom som exempelvis ont i halsen, snuva
- Hosta, feber speciellt i samband med hudutslag

## Infektionskänslig

- Patient som är nedsatt av olika anledningar

## Utlandsvårdad

- Ökad risk för bärarskap av multiresistenta bakterier

- Bedöm kontinuerligt alla patienter om de har ökad risk för att båda sprida smitta och att få en vårdrelaterad infektion.
- Bedöm om patienten har riskfaktorer samt omfattning av dessa. Ju fler ovanstående riskfaktorer patienten har desto högre ska patienten prioriteras för eget rum och/eller egen toalett. **Observera** att även en riskfaktor kan motivera enkelrum och egen toalett.

Se rutin: [Vårdhygienisk bedömning av riskfaktorer för smittspridning i vård och omsorg \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)