



Datum \_\_\_\_\_

Till dig som var på \_\_\_\_\_ (enhet)

## **Du kan ha blivit smittad av kikhosta**

### **Kikhosta**

Kikhosta smittar genom droppar från exempel hosta eller nysningar. Det behövs vanligtvis nära kontakt för att smittan skall spridas, så risken att du ska ha smittats är liten. Du behöver dock vara uppmärksam på förkylningssymtom den närmaste tiden. Det tar en till tre veckor från det att man blir smittad innan man blir sjuk. Det betyder att du kan bli sjuk fram till \_\_\_\_\_

### **Du kan behöva antibiotika**

Barn under 6 månader, gravida i vecka 29 eller senare och personer med nedsatt immunförsvar kan behöva antibiotika i förebyggande syfte. Om du eller ditt barn tillhör någon av dessa grupper uppmanas du att ta kontakt med din läkare eller med vården via telefonnummer \_\_\_\_\_ och berätta att du har fått detta brev.

Du kan få kikhosta och smitta andra även om du är vaccinerad eller redan har haft sjukdomen. Undvik därför att träffa spädbarn eller gravida om du får förkylningssymtom de närmaste tre veckorna. Vid symtom, kontakta vården via 1177 för läkarbedömning och eventuell provtagning. Berätta att du har fått detta brev.

### **Kontaktuppgifter**

Har du frågor, kontakta vården på telefonnummer \_\_\_\_\_

Mer information om kikhosta, vård och behandling finns på [1177.se](https://www.1177.se)

