

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24

Bukläge - dagkirurgi

Innehållsansvarig:

Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Förändring under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation i bukkläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp, ta eventuellt bort smala alternativt breda plattan nedanför huvudplattan
- Patienten sövs på rullvagn, vänds vid överflyttning till operationstoppen
- Armstöd - båda armar fästs på övre delen av operationstoppen och vinklas uppåt mot huvudändan
- Knäkudde under vristerna, inget tryck mot tårna
- Benremmar över underbenen
- Kontrollera att genitalia och bröst inte utsätts för tryck
- Diatermiapparat, diatermiplatta på baksida av låret

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK
- Blodtrycksmätning arm motsatt sida som PVK - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Saturationsmätning hand samma sida som PVK eller öron-probe
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Vid intubationsanestesi:
 - ögonförband eller tejp över ögonlocken
 - ansiktsskudde placeras på huvudplattan i stället för madrassdel och kudde
 - tubförlängare kopplas
 - kuffslang fästs längs med tuben
 - kontrollera i ansiktsskuddens spegel att patienten ligger bra efter vändning och att tuben inte knickats
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** Preoperativ fasta
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Patienten vänds vid överflyttning till rullvagnen och väcks
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anesthesi, se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum
- Städ rutiner operation, se ”Städ rutiner för operationssal” i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-13

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24