

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Sophia Arvidson, (sopar1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-03-25

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Fotkirurgi – chevronosteotomi, vinklingsosteotomi, tåamputation, tåartrodes mm – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Sophia Arvidsson, operationssjuksköterska

Malin Hermansson, operationssjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet samt mindre omarbetning.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå fotkirurgi.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod

Enligt preoperativ bedömning. Spinalbedövning, nervblockad med ultraljudsapparat alternativt generell anestesi.

Anesthesiutrustning

Sedvanlig utrustning. Blodtomhetsapparat. Ultraljudsapparat vid blockad.

Lokalanestesi i huden

Fråga operatör - behövs ej vid spinal eller blockad.

Hudvård

Håravkortning v.b. Descutansvamp och Klorhexidinsprit.

Sidomarkering

Ja. Sidomarkering av pariga organ preoperativt.

Planerad operationstid

30-90 min.

Patientuppläggning

Ryggläge. Ev kilkudde under höft på operationssidan. C-båge används från motsatta sidan (v.b.).

Risk

Allmän risk för tryckskador. Tryckskador kan uppstå efter blodtomhetsmanschett. Patient kan bli påverkad när man släpper blodtomheten.

Blodgruppering/Bastest

Enligt styrdokument - [Provtagning - preoperativ](#)

KAD

Nej.

Blåstömning

BladderScan enligt styrdokument - [Urinblåsekontroll perioperativt - SkaS Lidköping](#)

Antibiotika

Enligt ordination.

Trombosprofylax

Enligt ordination.

Blodtomt fält

Ja, blodtomhetsmanschetten placeras normalt på låret. Vid ingrepp med blockad kan manschetten placeras på underbenet, så distal som operationen medger. Blodtomhet läggs sterilt av operatör. Enligt styrdokument - [Blodtomt fält vid operation.](#)

Assistent

Nej.

Utrustning operationssidan

Plantopp, c-båge v.b., diatermi, genomlysningsplatta v b.

Övrigt

Dokumentera tid och tryck i Orbit för blodtomt fält samt informera operatör om tidsintervall om var 30:e minut. Benet i neutralläge postoperativt. Ofta smärtsamma ingrepp. Planera postoperativ smärtlindring i god tid.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Sophia Arvidson, (sopar1),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare, Åsa
Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-135

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25