

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-03-11

Innehållsansvar: Sophia Arvidson, (sopar1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-03-11

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Hand- och underarmskirurgi – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Sophia Arvidsson operationssjuksköterska

Malin Hermansson operationssjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare.

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för hand- och/eller underarmskirurgi.

## Arbetsbeskrivning

**Anestesimetod:** Enl. preoperativ bedömning. Larynxmask anestesi, lokalbedövning alternativt plexusanestesi med sedering vb.

**Anestesiutrustning:** Sedvanlig utrustning. Blodtomhetsapparat. Vid blockad plexusnål och ultraljudsapparat.

**Lokalanestesi i huden:** Ja (fråga operatör). Behövs inte vid plexusanestesi

**Hudvård:** Håravkortning v.b. Descutansvamp och Klorhexidinsprit. Vid öppna sår använd NaCl

**Sidomarkering:** Ja. [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

**Planerad operationstid:** 15 – 90 minuter.

**Patientuppläggning:** Plantopp, Ryggläge, armbord, ev. blodtomhetsmanschett på underarm (kompartmentsyndrom!) vid kort op-tid (max. 20-30 min) Vid längre op-tid på överarmen.

**Risk:** Allmän risk för tryckskador vid ryggläge. Tryckskador kan uppstå under blodtomhets-manschetten. Kompartmentsyndrom. Patienten kan bli påverkad när blodtomheten släpps.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**KAD:** nej

**Blåstömning:** Enl. Styrdokument: [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Antibiotika:** Enl. ordination

**Trombosprofylax:** Enl. ordination.

**Blodtomt fält:** Oftast. Blodtomhet läggs sterilt av operatör. Se Styrdokument [Blodtomt fält vid operation](#)

**Assistent:** Nej

**Röntgenbilder:** Nej/Ja vid frakturkirurgi.

**Utrustning operationssidan:** Plantopp, armbord, diatermi, se plocklista.

**Övrigt:** Dokumentera tid och tryck för blodtomt fält samt informera operatör om detta. Underarmen och framförallt handen i högläge postoperativt (armkudde).

[Lokalbedövning vid kortvarig handoperation](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Sophia Arvidson, (sopar1),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-149

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-03-11

**Giltig till:** 2027-03-11