

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anna Widunder, (annfl15), Överläkare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-10

Giltig till: 2027-03-10

Latexallergi i samband med operation

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Handläggning av patient med risk för eller känd latexallergi.

Förekomsten av latexallergi bland befolkningen är mindre än 2 %, dock betydligt högre för patienter med myelomeningocele och blåsextrofi. Patienter med känd latexallergi samt patienter med myelomeningocele eller blåsextrofi ska behandlas latexfritt. Vid tveksamhet bör inför elektiv kirurgi RAST-test kontrolleras.

De känsliga är allergiska mot alla gummiprodukter, den som har eksem reagerar på hårdaren och den som har slemhinne manifestation reagerar på proteinet i latexgummit, en slemhinneallergiker reagerar t ex på talkprodukter som bärare av latexproteiner.

Risk föreligger för anafylaktisk chock i samband med anestesi varför endast säkra produkter bör användas vid anestesi av suspekt latexallergisk patient.

Arbetsbeskrivning

Anestesi:

Infusionslösningar och blodprodukter är latexfria.

Allt förbrukningsmaterial, masker, blåsor m.m. är latexfria.

Operation:

Latexfria operationshandskar ska användas.

Silikonkateter eller tappningskateter ska användas istället för vanlig foleykateter som innehåller latex.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anna Widunder, (annfl15), Överläkare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-189

Version: 9.0

Giltig från: 2025-03-10

Giltig till: 2027-03-10