

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2026-02-03

Innehållsansvar: Anna Essemo, (annes2), Enhetschef

Giltig till: 2028-02-03

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Munskyddsanvändning på operationssal

Innehållsansvariga:

Anna Essemo, Enhetschef, Anestesi-Operation SkaS Skövde.

Jens Odén, Enhetschef, Anestesi-Operation SkaS Skövde.

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Munskydd används för att skydda det sterila området från att kontamineras samt att skydda personalen från smitta via stänk från operationsområdet

Arbetsbeskrivning

Munskydd ska användas av all sterilklädd personal i operationsteamet.

All övrig personal på operationssalen ska bära munskydd om de befinner sig inom en armlängds avstånd från sterilt iordningsställd operationsutrustning.

Dessa munskydd ska vara TYPE II R

Alla på operationssalen skall använda munskydd vid:

1. Kärloperation med främmande protesmaterial
2. Implantation av pacemaker och venport
3. Ortopedisk proteskirurgi
4. Ögonoperationer

5. Infektionskänsliga patienter, t ex leukopena patienter, immunosupprimerade patienter

Anestesiolog ska använda munskydd vid:

Invasiva åtgärder, t ex anläggande av spinalanestesi, EDA och CVK.

Vid uppdukning av ortopediska operationer används munskydd av pass på operationssalen.

Käll- och litteraturförteckning

Vårdhandboken

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anna Essemø, (annes2), Enhetschef

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-202

Version: 13.0

Giltig från: 2026-02-03

Giltig till: 2028-02-03