

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-05

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-05

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Varicer, bukläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändringar under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå variceroperation i bukläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggnings

Hud/vävnad: Risk för tryckskada, nervskada

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp, ta eventuellt bort smala/breda plattan nedanför huvudplattan
- Patienten sövs på rullvagn, vänds till bukläge vid överflyttning till operationstoppen
- Knäkudde under vristerna, inget tryck mot tårna
- Armstöd båda armar fästs på mitten av operationstoppen och vinklas uppåt mot huvudändan
- Benrem över underbenet på det ben som inte opereras
- Kontrollera att genitalia och bröst inte utsätts för tryck
- Diatermiplatta på baksida lår, motsatt operationssida
- Hårkorta
- Narkosbåge

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- PVK
- Blodtrycksmätning
- Saturationsmätning
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Vid intubationsanestesi:
 - Ögonförband
 - Ansiktsskudde placeras på huvudplattan istället för madrassdel och kudde
 - Tubförlängare kopplas
 - Kuffslang fästs längsmed tuben
 - Kontrollera i ansiktsskuddens spegel att patienten ligger bra efter vändning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) - vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Eventuellt blodtomt fält anläggs sterilt under operationen

Avveckling

- Patienten vänds till ryggläge vid överflyttning till rullvagn och väcks
- Hellindat ben
- Högläge av benen
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesisins disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-283

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-11-05