

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22

Inkontinensoperation, minislynga – perioperativ vård

Innehållsansvariga:

Erika Persson operaitonssjuksköterska

Johanna Edlund, anestesisjuksköterska

Nenad Vucelic, överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå inkontinensoperation, minislynga.

Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 15-30 min.

Anestesimetod: Sedering/larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

Antibiotika: Nej.

Trombosprofylax: Nej.

Lokalanestesi: Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

Vid vaken patient enligt överenskommelse med operatör.

KAD/Blåstömning: Blåstömning kateter före och efter ingreppet.

Patientuppläggning: Höga benstöd (benen ska ligga i 90° vinkel i höftleden), operationstäckte, båda armarna på armbord.

Risk: Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.](#)

Hudvård: Hårvkortning yttre blygdläppar. Tvättas med Hibiscrub, Klorhexidinsprit 5 mg/ml insida låren.

Utrustning operationssidan: Prolapsbord.

Postoperativt: Nätbyxa och binda.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-37

Version: 12.0

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22