

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-05-28

Inkontinensoperation, TVT Classic – perioperativ vård

Innehållsansvarig:
Erika Persson operationssjuksköterska
Johanna Edlund anestesijüksköterska
Nenad Vucelic, överläkare.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.
Omhändertagande av patient som ska genomgå inkontinensoperation
TVT Classic.

Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30-60 minuter.

Anestesimetod: Larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

Antibiotika: Nej.

Trombosprofylax: Nej.

Lokalanestesi: Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

KAD/Blåstömning: KAD; töm blåsan och proppa KAD innan operationsstart. Efter operation töms blåsan och KAD tas bort.

Patientuppläggning: Benstöd (benen ska ligga i 60° vinkel i höftleden), operationstäck, båda armarna på armbord.

Risk: Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Hudvård: Hela blygdbenet hårvorkortas. Tvättas med Hibiscrub, Klorhexidinsprit 5 mg/ml insidan låren och upp mot blygdbenet.

Utrustning operationssidan: Enligt operationskort, prolapsbord.

Postoperativt: Nätbyxa och binda.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-38

Version: 11.0

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-05-28