

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22

Inkontinensoperation, TVT-O – perioperativ vård

Innehållsansvariga:
Erika Persson operationssjuksköterska
Johanna Edlund anesthesisjuksköterska
Nenad Vucelic, överläkare.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.
Omhändertagande enligt vårdplan av patient som ska genomgå
inkontinensoperation, TVT-O.

Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30-60 minuter.

Anestesimetod: Larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

Monitorering/övrigt: EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

Antibiotika: Nej.

Trombosprofylax: Nej.

Lokalanestesi: Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

KAD/Blåstömning: KAD; töm blåsan och proppa KAD innan
operationsstart. Efter operation töms blåsan och KAD tas bort.

Patientuppläggning: Höga benstöd (benen ska ligga i minst 90° vinkel i höftleden eller mer), operationstäcke, båda armarna på armbord. Klä patienten så att obturatorgroparna är fria.

Risk: Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Hudvård: Håravkortning. Tvättas med Hibiscrub, Klorhexidinsprit 5 mg/ml insidan låren.

Utrustning operationssidan: Enligt operationskort, prolapsbord.

Postoperativt: Nätbyxa och binda.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-39

Version: 14.0

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22