

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska  
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2026-05-28

# Prolapsoperation – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Erika Persson operationssjuksköterska  
Johanna Edlund anestesisjuksköterska,  
Nenad Vucelic överläkare

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Ändring under KAD/blåstömning.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå prolapsoperation.

## Arbetsbeskrivning

**Planerad total operationstid:** Ca 60 – 90 minuter.preo

**Anestesimetod:** Spinal alt larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Enligt ordination.

**Lokalanestesi:** Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

**KAD/Blåstömning:** KAD; töm blåsan och proppa KAD innan operationsstart. Efter operation töms blåsan och KAD tas bort, om inte

annat ordineras. Inneliggande patienter ska ha kateter kvar, om inte annat ordineras av ansvarig operatör.

**Patientuppläggning:** Höga benstöd, operationstäckes, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

**Hudvård:** Eventuellt rakning. Tvättas med Hibiscrub samt Klorhexidinsprit 5 mg/ml på insidan av lår.

**Utrustning operationssidan:** Enligt operationskort. Prolapsbord.

**Postoperativt:** Nätbyxor och binda postoperativt.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-58

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2025-04-28

**Giltig till:** 2026-05-28