OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Martina Hansson, (marha217), Operationssjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-19
Giltig till: 2028-08-19

Vakuumexeres – perioperativ vård

Innehållsansvarig:
Martina Hansson operationssjuksköterska
Johanna Edlund anestesisjuksköterska
Nenad Vucelic överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå vakuumexeres.

Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30 minuter.

Anestesimetod: Masknarkos alt larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

Blodgruppering/Bastest: Provtagning - preoperativ. Kontroll av blodgruppering för ev immunisering.

Antibiotika: Nej.

Trombosprofylax: Nej.

KAD/Blåstömning: Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Patientuppläggning: Höga benstöd, operationstäcke, båda armarna på armbord.

Risk: Översträckning av ben och rygg. Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.

Hudvård: Tvättas med Hibiscrub.

Utrustning operationssidan: Enl plocklista, sug, ultraljud.

Preparat: Eventuellt, fråga operatören innan om uppsamlingsburk till sugen behövs.

Postoperativt: Nätbyxa och binda.

Övrigt: Rhesonativ ges i m om blodgruppen är negativ enligt ordination.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Martina Hansson, (marha217), Operationssjuksköterska

Granskad av: Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare, Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-71

Version: 12.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19