

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Analfissur med plugg, bukläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Förändring under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan av patient som ska genomgå operation i bukläge av analfissur med plugg.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Patienten sövs på rullvagn, vänds vid överflyttning till operationstoppen
- Armstöd med kuddar till båda armar fästs på mitten av operationstoppen och vinklas uppåt mot huvudändan
- Rullade benvärmare under vristerna, inget tryck mot tårna
- Benremmar över underbenen
- Vinkla isär benplattorna
- Kontrollera att genitalia och bröst inte utsätts för tryck

- Tippa huvudändan lite
- Diatermi + diatermiplatta baksida lår

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#), **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping.**
- PVK
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Blodtrycksmätning motsatt hand som PVK - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Saturationsmätning samma sida som PVK eller öronprobe
- Varma täcken
- Vid intubationsanestesi:
 - Ögonförband eller tejp över ögonlocken
 - Ansiktsskudde placeras på operationsbordet ovanför madrassen
 - Tubförlängare kopplas
 - Kuffslang fästs längs med tuben
 - Kontrollera i ansiktsskuddens spegel att patienten ligger bra efter vändning
 - Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- BIS övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, bladderscan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Patienten vänds vid överflyttning till rullvagnen och väcks
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-87

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24