

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Hanna Lundahl, (hanlu26), Ivasjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-24

Giltig till: 2028-08-24

# Hållbarhet läkemedelsblandningar och infusionslösningar

## **Innehållsansvariga:**

Hanna Lundahl, IVA-sjuksköterska, SkaS Skövde

Henrieta Jidbratt, överläkare anesthesi-IVA, SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

## Syfte

Skapa en enhetlig rutin för hållbarhet av läkemedelsblandningar samt infusions- och nutritionslösningar.

## Förutsättningar

Rutinen gäller på IVA och IMA SkaS Skövde.

- Infusionen ska ges som en obruten infusion och får ej kopplas ifrån patienten om hållbarhet i 24 timmar ska gälla.
- Man bör undvika att göra extra tillsatser i droppet på vårdrummet efter att droppet kopplats till patienten.

## Arbetsbeskrivning

- Hållbarhet för läkemedelsblandningar är 24 timmar, därefter skall blandningen bytas. Det gäller även läkemedel som inte blandas med något.
- Vissa läkemedel har kortare hållbarhetstid än 24 timmar (se tabell 1 nedan).
- Hållbarhet för parenteral nutrition med tillsatser av Addaven och Soluvit + Vitalipid är 24 timmar om tillsatserna gjorts under aseptiskt handhavande. Aggregat skall bytas efter 24 h.

- Hållbarhet för Glucos, NaCl och Ringeracetat är 24 timmar från iordningställande. Om tillsatser av Natrium och Kalium gjorts i infusionerna är hållbarheten 24 timmar om tillsatserna gjorts under aseptiskt handhavande.
- Hållbarhet för infusionsvätska till EDA är 72 h om den är färdigblandad och 24 h om tillsats gjorts på avdelningen.

Tabell 1 Läkemedel som har kortare hållbarhet än 24 h

| Läkemedel                   | Hållbarhet infusion | Hållbarhet aggregat | Observera    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Fosfentytoin (Pro-Epanutin) | 12 h                | 4 dygn              |              |
| Furosemid                   | 12 h                | 4 dygn              | Ljuskänsligt |
| Naloxon                     | 12 h                | 4 dygn              |              |
| Propofol                    | 12 h                | 24 h                |              |
| Tiopenthal                  | 12 h                | 24 h                |              |
| Valproat (Ergenyl)          | 12 h                | 4 dygn              | Kärlretande  |

## Källförteckning

Referens Svensk läkemedelsstandard 2025.2 D o k . I D : 1 3 4 0 8

- FASS Produktresumé (SPC), [www.FASS.se](http://www.FASS.se)
- AIDA ([www.APL.se](http://www.APL.se))
- ePed Instruktioner - ePed

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Hanna Lundahl, (hanlu26), Ivasjuksköterska

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9696-242963441-193

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-08-24

**Giltig till:** 2028-08-24